

Описание:

Небольшая плотная утка с короткой шеей. Длинная центральная пара перьев у самца в хвосте делает его узнаваемым среди всех других уток. От самца шилохвость и, тоже имеющего длинные центральные рулевые, морянка радикально отличается как коренастой фигурой, так и окраской. В брачном наряде преобладают темно-бурые (почти черные) и белые тона. Нередко в черном оперении, особенно часто — на голове, бывают белые перья от зимнего наряда, иногда белая окраска преобладает.

Чередование нарядов сложнее, чем у других уток. В июле самцы надевают летний наряд: выпадают украшающие рыжие перья на спине, в черном оперении появляются белые, бурые и рыжеватые перья. В августе, параллельно с линькой покровного оперения, сменяются маховые и рулевые. В сентябре начинается линька в зимний наряд, и некоторые самцы к отлету становятся уже преимущественно белыми. Но у большинства этот наряд вырастает на зимовках.

Самка не имеет удлинненных перьев в хвосте, у нее преимущественно бурая и серая окраска, брюхо белое; очень значительны индивидуальные вариации окраски, особенно на голове. Однако спутать самку морянки можно только с самкой гоголя, от которой морянка отличается маленькой головой и отсутствием каких-либо пятен на крыльях. Самки тоже имеют усложненную смену оперения, но характер окраски и все характерные признаки сохраняются, к отлету наряд в целом светлее, чем весной и летом, и также очень изменчив.

Молодые в первую осень в общем похожи на самку и очень изменчивы, отличаются от нее более монотонной окраской верха, без резких светлых каемок, однотонной темно-бурой шапочкой, у них более монотонная серо-коричневая, без темной поперечной полосы, окраска горла, передней стороны шеи и груди, темно-бурые глаза (у взрослых глаза светло-коричневые, охристые, до почти оранжевого). Годовалые самцы в их первую весну отличаются от более старых менее длинным хвостом и более короткими косицами на плечах, черный передник у них меньше. Крылья во всех нарядах однотонно темно-бурые. Вес 450—900 г, длина самцов 55—60 (хвост!), самок — 37—41, крыло самцов 20,5—25,8, самок — 19,2—24,6, размах 73—79 см. [1]

Распространение:

Пролет вида в области слабо выражен, проходит в апреле, но в отдельные сезоны пролетные стаи регистрируются в последних числах мая. Осенние кочевки в южной тайге наблюдали в первой декаде июля, в северной лесостепи пролет проходит в третьей декаде сентября-первой половине октября. [2]

Пролетный вид. Весной 1958 г. ее наблюдали в Омской области 12 мая и 8 июня она улетела на север [Корш, Каденац, 1961], по другим данным, ее массовый пролет в тот год прошел с 28 мая по 10 июня [Герасимова, 1961]. В тот год была отмечена ее гибель на оз. Пикетное Марьяновского района, когда там скопились тысячи этих уток. К 8 июня основная масса морянок улетела на север, а на озере осталось не более 300 особей и найдено 178 погибших птиц. Причиной гибели послужило отравление каким-то инсектицидом, содержащим органический фосфор [Корш, Каденац, 1961]. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. оз. близ п. Иртышский. 03.05.13 - 06.05.13 (Зирнит Денис, Круглова Елена)

2. Омская обл. Тюкалинский район 22.08.13 (Роман)



МОРЯНКА

Автор: Administrator

10.11.2012 16:38 - Обновлено 18.12.2013 13:47
