

Описание:

Немного крупнее вороны, самый мелкий и относительно большекрылый из луней. Самец наиболее темный из светлых луней, серо-сизый. Отличается от полевого и степного еще и наличием рыжих пестрин на нижней стороне тела и крыльев; на крыле сверху темная продольная полоса, снизу — две полосы. Черного на конце крыла больше, чем у других луней: первостепенные маховые, кроме 2—3 самых внутренних, целиком черные. На хвосте явные поперечные полосы (кроме центральной пары рулевых). Белой полосы на пояснице нет или она узкая. Полувзрослый самец (годовалый) похож на взрослого, но на теле и крыльях много рыжих пестрин.

Самка отличается от самок полевого и степного луней более светлым верхом крыла, особенно выражено охристое посветление на кроющих. На второстепенных маховых сверху, помимо краевой, видна еще одна четкая продольная темная полоса. На нижней светлой стороне крыла — Три отчетливые темные продольные полосы, как у самки полевого луня, но, в отличие от нее, светлый промежуток между первой (краевой) и второй полосами гораздо шире, чем между второй и третьей. На нижней стороне хвоста отчетливо видны 3 темные полосы, 4-я почти скрыта под кроющими, сверху хвост выглядит пестрым (мелкие светлые и темные полосы по бокам хвоста). Есть узкая белая полоска на пояснице. На «лицо» самка светлее самок других луней, вокруг глаза нет черного ободка (есть слабый буроватый), беловатая «скоба» на щеке широкая и смыкается за глазом со светлой бровью (у самок других луней — не смыкается), на ухе овальное темное пятно, не достигающее до клюва. В отличие от самок полевого и степного луней, светлого ошейника нет. Нижняя сторона тела имеет буроватый фон, с обильными темными охристо-бурыми пестринами. У годовалых самок остается много рыжих перьев ювильного наряда на нижней стороне тела. Молодые имеют красивую интенсивно-рыжую окраску, темнее и ярче, чем у молодых степных луней, кроме того, у них лицевой диск не окаймлен светлым ошейником. На крыльях снизу — полосы. Глаза у молодых самцов темно-серые, у молодых самок — бурые (у взрослых — желтые). Ноги желтые.

Телосложение стройное, тело плавно переходит в хвост. Как более легкие и относительно большекрылые среди луней, луговые имеют плавный и неторопливый полет, с редкими взмахами, крылья приподнимают V-образно сравнительно невысоко, угол между ними 1—120 град., первостепенные маховые сильно расставлены, крылья слабо заострены. Контактные признаки луговых луней любого пола и возраста: в вырезка внутреннего опахала 1-го первостепенного махового пера выдается за верш

ины кроющих кисти на 2—3 см (см. рис. 3). Вес 220—450 г, длина 41—52, крыло самцов 34,6—39,3, самок — 35,5—39,1, размах 97—120 см. [1]

Распространение:

Распространен повсеместно по безлесным местообитаниям. Обилие варьирует по сезонам, видимо, в зависимости от состояния кормовой базы. В южной тайге и под таежной зоной гнездится по вырубкам и болотам, имеющим элементы луговой растительности, где численность варьирует от очень редкого и редкого на переходных болотах и зарастающих вырубках (от 0,1 до 0,4 ос.) до малочисленного и обычного (0,8-5,2 ос.) на болотах подтаежной зоны. В северной лесостепи (1,6 ос.) и пойме р. Иртыш на всем, протяжении в области тяготеет к лугам. В степи и южной лесостепи обычен. Тяготеет к приозерным участкам степи и переувлажненным залежным землям, где его обилие в пределах правобережных и левобережных (по отношению к р. Иртыш) территорий идентично (около 1,2 ос.). Послегнездовая численность здесь возрастает почти в 4 раза (около 4,6 ос.) [2]

Гнездящийся перелетный вид. В северной лесостепи близ бывшего пос. Беляшовотри пуховых птенца в гнезде найдены 10 июля 1998 г. В гнездовой период (в июне и в первой половине июля) луговой лунь редок в пойменных ивняках, выпасах и лугах, покосах (0,2 и 0,8). В начале июля, с началом интенсивного выкармливания птенцов, луговой лунь более заметен и обычен в пойменных лесолуговых ландшафтах (1-3). В послегнездовой период с началом кочевок (со второй половины июля и в августе) он становится редок в пойменных лугах, покосах и ивняках (0,2-0,6).

По среднелетним показателям луговой лунь редок в пойменных лесолуговых ландшафтах (0,4), в среднем по району исследований очень редок в течение лета (0,01) со снижением обилия в августе с началом отлета (0,004). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. г. Омск, пос. Асташково, сады. 07.09.13 (Ветер)



ЛУГОВОЙ ЛУНЬ

Автор: Administrator

10.11.2012 16:18 - Обновлено 24.09.2013 14:20

