

## Описание:

Размерами значительно крупнее вороны, самый крупный и ширококрылый из луней. Сходных видов нет. В окраске самца много серебристо-сизоватого цвета - хвост, большие участки на крыле сверху и почти все крыло снизу; голова, туловище и часть крыла сверху коричневые, может быть больше или меньше светлых охристых или серебристо-серых пестрин, обычно их больше на голове, вплоть до преобладания охристого или светло-серого цвета, концы крыльев черные. Глаза желтые. Самка сверху и снизу темная, от серовато-бурого до шоколадно-коричневого, на голове охристо-желтая или кремовая "шапочка", такого же цвета горло и передний край крыла от основания до кистевого сгиба. Форма этих светлых пятен на голове и крыле очень изменчивы, крыло нередко целиком бурое. Сверху на крыле может быть сизый налет. Глаза коричневые. Молодые в первую осень похожи на самку, но на бурых перьях обычно есть охристые каемки и пятна, снизу на крыле часто бывает светлое пятно в основании первостепенных маховых. Бывают молодые однобразной темно-бурой окраски. Глаза у молодых бурые. Второгодки одеты в целом как молодые, но обычно с более выраженным охристым пятном на переднем крае крыла. Взрослую окраску самцы приобретают на 4-й календарный год. На 3-м календарном году у самца наряд как у взрослого, но серый цвет на крыле и хвосте более темный и с "грязью", нередки элементы ювенильного наряда. Самки одевают взрослый наряд на 3-й календарный год. Телосложение и повадки типичные для луней, полет с V-образно поднятыми крыльями, но конкретное их положение меняется в зависимости от характера и условий полета. Вес самцов 400-670, самок - 540-800 г, длина 48-55, крыло самцов 37.2-41.8, самок - 40.4-43.5, размах 110-142 см. [1]

## Распространение:

Весной появляется в последней декаде апреля, осенью в последней декаде сентября уже не встречается. Обычный вид лесостепных и степных пресных озер с развитыми тростниковыми зарослями. Обилие по сезонам варьирует соответственно с состоянием кормовой базы: в северной лесостепи от 1 до 4 ос, (средняя многолетняя 1.6 ос.), в степи и южной лесостепи от 2,2 до 4 ос. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Гнездование болотного луня в лесостепи Западной Сибири длится с 1 мая по 20 июля [Гибет, 1959]. В гнездовой период (со второй половины мая до конца июля) болотный лунь обычен на надпойменных ивняково-осоковых болотах и пойменных ивняках, выпасах, на городских пойменных открытых низинных болотах, пойменных водоемах, лугах аэропорта и крупных поселках (1-3), редок на свалках (0,2), слабосоленых озерах (0,3), полях многолетних трав и в осиново-березовых колках с лугами, покосами (0,6), в послегнездовой период отмечен в более широком спектре местообитаний. В первой половине августа обычен на надпойменных открытых низинных болотах и ивняково-осоковых болотах (3—4), в полях многолетних трав с колками (2), а также в городе (пойменных низинных болотах и пойменных водоемах левобережья Иртыша (1-2)). В ряде остальных местообитаний лесопольных ландшафтов этот лунь редок (0,1-0,6), а также на пойменных лугах, покосах и слабосоленых озерах (0,2-0,6). С началом отлета в 2-й половине августа этот лунь отмечен в тех же местообитаниях лугово-болотного ландшафта (1—4), редок на пойменных лугах, покосах, городских пойменных низинных болотах, слабосоленых озерах и на лугах аэропорта (0,3-0,8).

По среднелетним показателям болотный лунь обычен на заливных лугах, городских пойменных низинных болотах и пойменных водоемах левобережья Иртыша (1), редок в ряде местообитаний лесопольных и пойменных лесолуговых ландшафтов, свалках, лугах аэропорта, крупных поселках и слабосоленых озерах (0,1-0,5), в среднем по району исследований редок и очень редок в течение гнездового периода и в конце лета вновь становится редким с возрастом обилия в августе в результате послегнездовых миграций (0,1-0,2). [3]

### Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобынине. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. —

## БОЛОТНЫЙ ЛУНЬ

Автор: Administrator

10.11.2012 16:25 - Обновлено 21.05.2016 19:23

---

Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

З. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

### Наблюдения:

Регулярно встречается в городе и по области близ водоемов.

Прилет: 14.04.14 (Круглова Елена)



# БОЛОТНЫЙ ЛУНЬ

Автор: Administrator

10.11.2012 16:25 - Обновлено 21.05.2016 19:23

---



