

Описание:

Хищник средних размеров, крупнее вороны примерно в 1,5 раза. От всех других наших хищных птиц надежно отличается слегка вильчатым хвостом. Кроме того, в силуэте летящего коршуна характерна форма кистевого сгиба - птица парит на слегка согнутых крыльях. Парением пользуются часто, держа крылья горизонтально, в одной плоскости. Преобладающая окраска темно-коричневая, в целом довольно темная сверху и снизу, голова нередко светлее туловища, есть птицы со светлым, рыжевато-коричневым оперением. Почти у всех птиц на плечевом отделе крыла сверху диагональное посветление. Самцы и самки окрашены сходно. У молодых охристые пестрины на нижней стороне тела, голове, верхних кроющих крыла, снизу крыла - пятно, варьирующее в размерах, образованное светлыми основаниями первостепенных маховых. Вес 630-950 г, длина 55-60, крыло самцов 42.6-50.5, самок - 44.8-51.5, размах 160-180 см.[1]

Распространение:

В южной лесостепи появляется к середине апреля. Гнездится в степной и лесостепной зонах, и в антрополических ландшафтах лесной зоны. В южной тайге регулярно встречается во вторичных лиственных лесах и припойменных местообитаниях в агроландшафтах (0,2-0,33). В северной лесостепи обычен в колках и перелесках (до 5 или 0,2-1,2 в разные годы). В колках степной зоны малочисленный (до 0,4 ос.). [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В гнездовой период (со второй половины мая до второй половины июля) он обычен на свалках и полях многолетних трав с колками, и на пойменных водоемах левобережья Иртыша с городскими пойменными открытыми низинными болотами, и на надпойменных открытых низинных болотах (2-5). Редок на пойменных лугах, покосах, в осиново-березовых колках с лугами, покосами, на лугах аэропорта, выгонах и в садах (0,2-0,6). Над березовой рощей районов одноэтажной деревянной застройки черного коршуна наблюдали 21 и 26 июля 1973 г. над колонией грачей, где он пытался ловить молодых птиц.

В послегнездовой период с началом предолетных перемещений (со второй половины июля) встречается реже. В это время он редок на лугах аэропорта, городских пойменных открытых низинных болотах, заливных лугах и на ивняково-осоковых болотах (0,2-0,6). В августе начинается его отлет. Над районами одноэтажной застройки Омска пролетных коршунов наблюдали 10 и 27 августа 1997 и 1998 гг. В это время он редок на заливных лугах и ивняково-осоковых болотах, свалках и на слабосоленых озерах (0,2-0,8). В начале XX столетия в конце лета его стаи видели во время пролета над старой загородной рощей Омска [Коте, 1910].


По среднелетним показателям, черный коршун обычен на свалках (1), редок в лесопольных и лугово-болотных ландшафтах, а также в городе (пойменном левобережном комплексе местообитаний и расположенных несколько выше суходольных лугах аэропорта). На синантропность этого хищника еще в 1951 г. указывал Г.П. Дементьев. Очень редок черный коршун в пойменных лесолуговых ландшафтах и на слабосоленых озерах. В среднем по району исследований этот хищник очень редок в гнездовой и послегнездовой период (0,02), в конце лета его обилие уменьшается в связи с отлетом (0,004). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.
2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.
3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. р-н с. Любино-малоросы 16.07.12 (Зирнит Денис).
2. Омская обл. Крутинский район, близ. д. Калачики. 15.05.12 (Зирнит Денис).
3. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 09.05.09; 11.04.13.
(Круглова Елена).
4. Омская обл. заказник. "Пойма Любинская" 02.08.13 (ST520).



ЧЕРНЫЙ КОРШУН

Автор: Administrator

10.11.2012 16:25 - Обновлено 08.09.2013 05:10

