Описание:

По комплекции похож на канюка, но крупнее, несколько более длиннокрылый и длиннохвостый. Снизу преобладающая окраска блед-но-палевая, очень светлая. Характерным элементом окраски низа явля- ются мелкие пестрины на кроющих крыла, большое темно-бурое пятно на кистевом сгибе и темные концы маховых, образующие широкий кант по заднему краю крыла; еще есть 2—4 узкие полосы по второстепенным и частично — по первостепенным маховым. Сверху крыло относитель-но ровного охристо-бурого цвета, есть посветление на основаниях пер-востепенных маховых, передний край крыла также светлее остальной его верхней поверхности. Хвост сверху и снизу почти чисто-белый, с широкой предвершинной темной полосой и I—4 более узкими. Есть пред-положения, что у самца 2—4 узкие полосы, а у самки — только одна, реже — 2; более старые птицы имеют больше полос на хвосте. На брюхе сгущения темных пятен, частично сливающихся в большие пятна по бо-кам или даже в одно большое пятно. На голове и шее тоже многочислен-ные пестрины. Есть наблюдения, что у самки обычно более темное брю-хо, у самца чаще более темные голова и шея, а брюхо более светлое. Однако рисунок оперения подвержен большим индивидуальным вари-ациям. Самка немного крупнее самца.

Молодые в целом светлее взрослых, но брюхо сплошь темно-бурое; го-лова, шея и грудь — светлые, с продольными пестринами, краевая по-лоса на хвосте одна, широкая и размытая, иногда очень бледная, сверху кроющие крыла и спина обычно гораздо светлее, чем у старых птиц, светлое поле на основаниях первостепенных маховых обычно более бе-лое, меньше пестрин на нижней поверхности крыла. На втором году жизни окраска представляет собой нечто промежуточное между юве- нильным и взрослым нарядами.

У всех птиц глаза светло-коричневые или буроватые, вся цевка опере-на. Охотно и подолгу парят, при этом крылья слегка приподняты над горизонталью. Часто охотятся в медленном полете, при ветре могут за-висать на месте, лишь слегка подправляя положение тела крыльями. Вес 700—1700 г, длина 50—61, крыло самцов 40,3—46,0, самок — 43,0— 47,3, размах 120—150 см. [1]

Распространение:

Зимующий вид. В фондах Омского государственного историко-краеведческого музея находится экземпляр зимняка, добытый в октябре 2003 г. в Любинском районе. В Омском округе появлялся осенью на пролете и иногда оставал-ся на зиму [Шухов, 1926]. За 5 лет наблюдений 1 раз отмечен на зимовке близ Омска [Лавров, 1922]. [2]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Тарский район. (Виктор Кареба).

2. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 15.10.13 (Круглова Елена).

3. Омская обл. близ д. Подгородка. 28.09.13 (Зирнит Денис).

3. Омская обл. близ д. Лежанка. 12.10.13 (Зирнит Денис).

