

Описание:

Хищник средних размеров, примерно в 1,5 раза крупнее вороны. Более всего из хищных птиц похож на канюка. Маленькая узкая голова, невыраженность свойственных многим хищникам надбровий и небольшой клюв делают осоеда несколько похожим на кукушку. Окраска чрезвычайно изменчива, особенно снизу — от сплошного темно-бурого или темно-коричневого до желтого и почти белого через разные переходные варианты, а также с участием рыжего цвета. Чаще всего бывают пятнистыми и поперечно-полосатыми. Сверху окраска не столь изменчива, серо-бурая или бурая. Для диагностики важна окраска хвоста: она тоже изменчива, в общем серо-бурая, но сверху хвост всегда с широкой вершинной темной полосой и двумя более бледными и узкими полосами ближе к основанию рулевых. Снизу на сером фоне хвоста тоже три темные полосы, но из них хорошо видны две, а третья частично закрыта нижними кроющими. На крыле снизу много крупных темных пестрин, которые у большинства птиц образуют несколько полос вдоль крыла, всегда есть четкая темная полоса по заднему краю крыла, а также большое пятно на кистевом сгибе, которое у темных особей сливается с остальной окраской. Крылья относительно узкие, хвост длинный и слегка закругленный. Против света летящая птица выглядит темным силуэтом, но примечательно именно для осоеда, что первостепенные маховые при этом просвечивают. Глаза у взрослых ярко-желтые. Полет немного «расхлябанный», «вороний», в скользящем полете держит крылья немного согнутыми, но при этом задний край крыла почти прямой. Парит редко, при этом держит крылья в одной плоскости. При близком определении признаками осоеда являются жесткие закругленные перышки вокруг клюва, похожие на чешую. Цевка покрыта со всех сторон мелкими многоугольными щитками. Когти относительно короткие и тупые. Самец сверху более серый, чем самка, голова чаще всего пепельно-серая, самка сверху скорее бурая, снизу самки обычно более полосаты, чем самцы.

Молодые еще более изменчивы, чем взрослые, в среднем более темные и с более полосатыми крыльями, на спине часто бывают светлые пятна, темные концы первостепенных маховых занимают больше места, чем у взрослых; по заднему краю хвоста и крыльев, а также по вершинам верхних кроющих крыла проходит узкая светлая полоска, а темная полоса по заднему краю крыла нечеткая; темных полос на хвосте не 3, а 4, как сверху, так и снизу, и они менее четкие, чем у взрослых; на пояснице обычно светлая полоса; часто голова светлее тела. Глаза темные. На востоке 3. Сибири обитает хохлатый осоед, см. отличия в его описании. Вес 600—1000 г, длина 52—60, крыло самцов 38,6—43,4, самок — 39,8—44,7, размах 135—150 см.

Голос. Чистый, немного жалобный свист «пииию». [1]

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД

Автор: Administrator

22.06.2014 16:50 - Обновлено 08.09.2015 02:41

Распространение:

Возможно гнездящийся вид. Пара осоедов обнаружена 26 мая 2000 г. в подтаежных лесах севернее пос. Большие Уки с Мартином Фладе и Сюзанной Винтер. [2]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. С.А. Соловьев. "Дневные хищные птицы и совы Омского Прииртышья". Электронный научный журнал «Вестник Омского государственного педагогического университета», 2006.

Наблюдения:

1. Омская обл. Марьяновский р-н, вблизи н.п. Кара-Терек 07.06.14 (Галеев Олег)

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД

Автор: Administrator

22.06.2014 16:50 - Обновлено 08.09.2015 02:41

2. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 22.07.14; 10.08.15
(Круглова Елена).



ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД

Автор: Administrator

22.06.2014 16:50 - Обновлено 08.09.2015 02:41

