Описание:

Немного крупнее голубя. В окраске преобладают серые, рыжеватые и белые цвета. Самцы и самки сходны по размерам и окраске, но у самца есть черное горловое пятно, а спина чисто серая. У самки нет сплошного черного горлового пятна, но могут быть черные пестрины либо горло чисто-белое или беловатое, и в целом самка чуть более тусклая и рыжая. Сходных видов нет. Сезонные изменения окраск и незначительны: весной и в первую половину лета рябчики темнее, чем осенью, так как за зиму обнашиваются светлые каемки на большей части оперения и силь нее проступают темные пестрины. Молодые до осенней линьки похожи на самку, но с менее четким рисунком, сверху рыжевато-бурые, со светлыми продольными ш трихами. В свою первую зиму и следующее (2-е календарное) лето (до августа-сен тября) молодые самцы и самки похожи на более старых. Держа птицу в руках, мо жно отличить их по окраске второго от конца крыла махового пера, внешнее опах ало которого имеет четкий поперечный рисунок и число светлых полос колеблется от 8 до 11. У взрослых птиц это опахало имеет от 4 до 7 светлых поперечных п олос либо все белое. У моло¬дых кончики 1-го и 2-го маховых заостренные, у ста рых — закругленные, как остальные маховые. Вес 300—500 г, длина 35—37, крыл о 15,0— 18,6, размах 48—54 см. [1]

Распространение:

Оседлый вид. Состояние численности в настоящее время соответствует ситуации с глухарем. До 1994 г. - массовый вид таежной зоны, обычный вид подтаежной зо ны (к южной границе зоны численность уменьшается до уровня "малочисленный"). Гнездится практически повсеместно, кроме болот и сельхозугодий, но наибольшее обилие характерно для мозаичных пойменных биотопов, вырубок и участков темнох войного леса (16-20 токующих самцов на 1 км2). В лиственных лесах (до 8 пар) и рямах (до 5 пар) обилие ниже. В послегнездовой период пропорциональное (гнез довому периоду) увеличение численности характерно, для темнохвойных участков и припойменных местообитаний (до 6-кратиого, свыше 120 ос,). В результате послег - нездовых перемещений рябчики также концентрируются в рямах (свыше 100 ос.). В результате особенностей осени 1994 и зимы 1994-1995 гг. обилие резко сократ илась и со-ставило в 1995-1997 г. менее 1 пары на 1 км2. По данным Управления

охотхозяйства области (Состояние окружающей среды, 1997) абсолютная численность вида в период 1994-1996 гг. (на фоне-падения численности) составила 40-15 тыс.особей. Последняя цифра совпадает с нашей оценкой для 1995-1996 гг. Приблизительная оценка состояния вида в период до 1994 г. по нашим данным составляла около 200 тыс. особей. [2]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

Наблюдения:

1. Омская обл. Тарский р-н. 28.05.12 (В.А.Ш.)

2. Омская обл. Большеуковский р-н. (Князев Святослав)

РЯБЧИК

Автор: Administrator
10.11.2012 16:01 - Обновлено 02.04.2015 07:57



