Описание:

Крупная птица. Хорошо отличается от тетерева размерами, более шим слегка закругленным хвостом и отсутствием белых полос на крыле. Оперение самца в основном темных тонов, может быть с более или менее многочисленными белыми пятнами на брюхе. На территории южной половины Урала и З. Сибири обитает особый «белобрюхий» уральский подвид, у самцов на брюхе от 30 до 95% перьев — белые. Севернее глухари более темные.

Глухарка (копалуха) имеет покровительственное пестрое оперение. Несмотря на большую разницу в размерах, ее легко спутать с тетеркой, особенно на расстоянии. У глухарки хвост закругленный, широкой бе-лой полосы на крыле нет (есть узкая), передняя сторона шеи и верх гру¬ди (пластрон) чаще всего однотонно или почти однотонно рыжие. Иногда (чаще — на севере ареала) встречаются глухарки без рыжего пластрона, с преобладанием серого цвета на шее и груди. Глухари взрослеют и растут в течение трех или более лет. В птенцовом наряде (до конца лета) быстро растущие самцы уже хорошо отличаются от самок по преобладанию серого на голове и шее и темных тонов в оперении в целом, тогда как молодые самки преимущественно рыжие. В сентябре — начале октября молодые самцы и самки одеваются в первый осенний наряд, в целом похожий на взрослый. В этом наряде у самцов оперение немного светлее, чем у старых, на «бороде» и груди белый с труйчатый рисунок, хвост короткий, рулевые перья с белой концевой полоской, узкие и закругленные (у старых они имеют прямой обрез, концы черные), клюв и «борода» маленькие, вес самцов составляет в первую зиму не более 70—80% веса старых. Самцы-двухлетки (3-й календарный год) по окраске почти такие же, как старые, но еще имеют короткий хвост; рулевые закругленные, часть их с белой концевой полосой.

Молодые самки в первом осеннем наряде и до следующего лета отлича¬ются от старых по более рыжей окраске и большому рыжему пластрону; контактный признак: поперечный рисунок на рулевых доходит до вершины пера, которая не белая (у взрослых самок рулевые с широкими белыми каемками).

У молодых самцов и самок в первую осень, зиму и до следующего лета два наружных маховых пера заостренные и с более или менее выраженным крапом на вершине. У более старых птиц все первостепенные маховые, в т.ч. и самые наружные

,□закруглены□и□без□крапа.□Взрослые□самцы□весят□2,7—5,1□кг,□достоверный□рекорд□—□6,5□кг,□вес□самок□1,7—2,3□кг,□длина□самцов□—87,□самок□—□45—57,□крыло□самцов□33,1—42,3,□самок□—□27,0—32,5,□размах□87—125□см.□[1]

Распространение:

Численность□вида□претерпела□резкие□изменения□за□период□наблюдения.□До□1994□г.□в□наиболее□предпочитаемых□гнездовых□биотопах□(участки□кедрового□и□темнохвойного□захламленного□леса,□вырубки,□сосновые□рямы)□обилие□гнезд□или□выводков□составляла□от□2□до□3,3□на□1□км2.□Осень□1994□г.□характеризовалась□максимальной□за□5-летний□период□наблюдений□численностью□глухаря□на□фоне□неурожая□ягоды,□что□вызвало□регулярные□посещения□птицами□сельхозугодий,□где□они□попали□под□пресс□браконьерства.□Условия□зимы□(чередование□резких□оттепелей□и□похолоданий),□по-□видимому,□вызвали□массовую□гибель.□В□результате□статус□вида□в□период□1995-1997□гг.□оценивается□как□"очень□редкий".□С□наступлением□периода□линьки□самцы□концентрируются□на□сфагновых□и□осоко-сфагновых□болотах□(1-3□ос.).□Осенью□при□созревании□ягоды□птицы□концентрируются□по□сфагновым□болотам,□рямам□и□ягодниковым□склонам.□[2]

Литература:

1.□В.К.Рябицев.□"Птицы□Урала,□Приуралья□и□Западной□Сибири".□Екатеринбург.□Изд-во□Уральского□университета,□2000.

2.В.В.Якименко.□"Материалы□по□распространению□птиц□омской□области"□Сообщение□1.□Неворобьиные.□Естественные□науки□и□экология.□Ежегодник□ОмГПУ.□–□Вып.□3.□–□Омск:□Изд-во□ОмГПУ,□1998.

Наблюдения:

1. Омская обл. Тарский р-н. (Виктор Кареба).

2. Омская обл. Большеуковский р-н. (Теплоухов Владимир).





ГЛУХАРЬ

Автор: Administrator
10.11.2012 16:03 - Обновлено 31.03.2015 03:38

