

ПЕРЕПЕЛ

Автор: Administrator

10.11.2012 16:04 - Обновлено 22.06.2014 16:41

Описание:

Самая маленькая из куриных птиц, с дрозда. Окраска покровительственных рыжих и бурых тонов, в виде пестрин, разбросанных по всему телу. Самец и самка сходны по окраске и размерам, отличия в том, что у самца по подбородку и горлу идет темная продольная полоска, есть четкий черно-белый полушейник. У самки низ головы однотонно охристо- или буровато-белый, без полосы, нет ошейника, на груди округлые темные пятна. От коростеля и погоныша перепел отличается более к оренастой фигурой, коротким коническим клювом, более короткими и короткопалым и ногами. У летящего перепела ног не видно. Сезонных изменений окраски нет. Молодые похожи на самку, но верх более монотонный, с не столь контрастным рисунком, есть пятнистый рисунок на боках тела; маховые перья более темные, чем у взрослых, менее выражена полосатость на наружном опахале, меньше охристых пятен. Определение пола возможно с двухнедельного возраста, когда у самок появляются на груди охристые перья с темными пятнами, а у самцов — рыжие, без четких пятен. Годовалых птиц можно отличать от более старых при близком осмотре: у них 2—4 (обычно — 3) наружных маховых пера остаются от прошлогоднего наряда и потому более изношены, чем остальные, сменившиеся зимой (у взрослых зимой сменяются все маховые). Вес 70—155 г, длина 16—18, крыло 10,6—11,8, размах 32—35 см. [1]

Распространение:

Обычный вид лугополевых ландшафтов. В южной тайге населяет сельхозугодья и залежи на местах деревень или сельхозугодий. В подтаежной зоне, кроме сельхозугодий, населяет сухие межлесные луга, где его численность варьирует в зависимости от уровня увлажнения территории зоны: обилие в засушливые годы возрастает (до 3 ос.) по сравнению с "нормальными" сезонами. В северной лесостепи населяет сельхозугодья (выпаса, сенокосы, поля злаковых), где является в разные сезоны малочисленным или обычным видом (1,2-5,4 ос., среднемноголетняя - 3,4 ос.). В степной зоне обилие в разных районах области (1,6 ос.) идентично на территориях, вышедших из-под влияния хозяйственной деятельности человека (залежи и участки "степи"). [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В предгнездовой период (в первой половине июня) перепел обычен в полях многолетних трав открытых (8) и с колками (4), а также на поливных полях многолетних трав с полезащитными полосами и колками (2) и лугах аэропорта (1). В пойменных лугах, покосах тоже обычен (5), а в пойменных ивняках с выпасами редок (0,4). В окрестностях Омска в 1962 г. кладка из 16 слабонасиженных яиц найдена 16 июня, а птенцы в недельном возрасте - 21 июня [Гынгазов, Миловидов, 1977]. В гнездовой период (во второй половине июня) перепел встречается в более широком наборе урочищ лесопольных ландшафтов, предпочитая поля озимых с колками, где обычен (8), и поля однолетних трав с колками (2), поля кукурузы, яровых с колками и такие же поливные поля с полезащитными полосами (1). В полях яровых и полях многолетних трав с колками и поливных полях многолетних трав с колками и полезащитными полосами редок (0,4-0,8). В послегнездовой период с началом откочевки (с первой половины июля) он обычен или редок в тех же местообитаниях лесопольных ландшафтов, что и ранее, с предпочтением полей однолетних трав с колками (9).

В пойменных лесолуговых ландшафтах редок после начала механизированного сенокоса (0,8). На суходольных лугах аэропорта в это время обычен (3), а во второй половине июля его обилие здесь возрастает в 13 раз и он становится многочислен. На остальной территории лесопольных ландшафтов становится редок, что, возможно, связано с его откочевкой из-за начавшейся уборки зерновых и скашивания многолетних трав. Перед отлетом в первой половине августа в лесопольных ландшафтах по-прежнему редок и лишь в полях кукурузы обычен (8). Поля кукурузы в это время представляют собой зеленые "оазисы", которые своей укрытостью по сравнению с другими агроценозами очень привлекают перепела. Во второй половине августа плантации кукурузы по-прежнему привлекательны для него, как и поля подсолнечника (8). В последнем местообитании его обилие, возможно из-за пролетных и местных особей, возрастает в 13 раз. В целом на остальной территории во второй половине августа он исчезает.

По среднелетним показателям обилия перепел в наибольшей степени предпочитает суходольные луга аэропорта (6), где его меньше всего беспокоят. Лесопольные и пойменные лесолуговые ландшафты менее привлекательны для него в силу значительной сельскохозяйственной нагрузки на эти территории, как и свалки (1). В среднем по району исследований его обилие возрастает с первой половины июня (0,8), к концу августа - в 3,8 раза, что, возможно, связано с пролетом птиц северных популяций. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Черлакский р-н. 07.06.14 (Ксендзов Валерий)

ПЕРЕПЕЛ

Автор: Administrator

10.11.2012 16:04 - Обновлено 22.06.2014 16:41

