Описание:

Размеры средние, с тетерку. Основной тон окраски верха тела — песочный, с бурым рисунком. Вся брюшная сторона и крылья снизу чисто-белые, сверху на крыле большое белое поле. Сходных видов нет. В брачное время у самца на шее широкие черные и белые полосы, кото-рые к середине лета пропадают, и голова с шеей становятся, как и у самок, одного цвета со спиной. В небрачное время самцы отличаются от самок наличием поперечного струйчатого рисунка на спине и крою-щих крыла (издали не видно), 4-е (считая снаружи) маховое перо укоро-ченное. По размерам самец и самка почти не отличаются, У молодых самочья окраска, но первостепенные маховые не черные, а с бурыми и охристыми полосами. Часть этих перьев (наружные) сохра-няются до следующего лета. Брачный наряд появляется у самцов ко вто-рой весне (3-й календарный год). Вес 550—950 г, длина 40—45, крыло 23,8—25,9, размах 105—115 см. [1]

Распространение:

Ранее гнездящийся вид. В конце XIX в. стрепет появлялся близ Омска с 20 апре-ля. Изредка пары оставались на лето, но в августе или начале сентября исчезали [Словцов, 1881]. За 10 лет наблюдений стрепет появлялся с 20 апреля 1897 г. по 29 ап-реля 1895 г. [Яшеров, 1902а]. Охотники стреляли его на расстоянии от 2 до 5 верст от города [Мельников, 1887а]. Два раза во время охоты на тетеревов из-под собаки были добыто 5 стрепетов [Сотников, 1892а]. Птицы прилетали в конце мая и были обычны в окрестностях Омска [Степанов, 1886], а в иные годы были многочислены [Морозов, 1898а].

Со времени постройки Транссибирской магистрали обилие стрепета значи-тельно снизилось. Взрослая самка добыта 16 июня 1898 г. у аула Такпулат Омского уезда у южной границы островных лесов. Было высказано предположение, что в то время северная граница гнездования стрепета проходила 55°N, а не 54°N [Елпатьев- ский, 1901]. На лугах близ города пару этих птиц наблюдали 7 июня 1899 г. [Коте, 1910].

В начале XX в. стрепет был нередок близ города, гнездился у пос. Подгородка Омского района [Лавров, 1925] и встречался близ Омска на участках ковыльных лугов за березовой рощей [Ручкин, 1966] на месте современных улиц Челюскин-цев. [2]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Руско-Полянский р-н 2000г. (Грищенко Владимир).