

Описание:

Очень похожа на обыкновенную горлицу (с большого расстояния практически неотличимы), немного крупнее. Следует отличать от обыкновенной горлицы по общему бурому тону верха тела, ближе можно разглядеть чешуйчатый рисунок, образованный рыжими каемками перьев спины и кроющих крыла. Белая полоса по краю хвоста более узкая и тусклая. Зеркальца по бокам шеи состоят из чередования черных и сизых (не белых) полосок. Голова и грудь более рыжевато-коричневые, чем у обыкновенной горлицы. Если птица в руках, то ее можно отличить по хвосту: на крайнем рулевом темно-серая окраска заходит на внешнее опахало (см. рис. 5); длина крыла чаще всего больше 18,5 см. Самка лишь незначительно отличается от самца более тусклой окраской груди. Молодые еще более блеклые, без полосатых пятен на боках шеи. Вес 170—300 г, длина 33—35, крыло 17,5—22,0, размах 55—60 см. [1]

Распространение:

Обычный, местами многочисленный вид, населяющий лиственные леса. Весенний пролет проходит в первой-второй декадах мая. В таежной зоне встречается только по агроландшафтам. В подтаежной зоне населяет незаболоченные колки (0,6-1,6 ос.). В степи и лесостепи обычна по колкам (1,8-14,2 ос. в разные сезоны), предпочитает захламленные участки леса (до 33,4 ос.). [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Прилет у Омска отмечен 29 апреля 19

БОЛЬШАЯ ГОРЛИЦА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:55 - Обновлено 29.06.2013 17:46

69 г. [Гынгазов, Миловидов, 1977]. На пролете во второй половине мая большая горлица обычна в пойменных ивняках, выпасах (2) и редко в полях яровых и однолетних трав с колками (0,2).

На гнездовании в июне она обычна в пойменных ивняках, выпасах, на полях кукурузы (2) и в поливных полях многолетних трав с колками (1), редко в полях однолетних трав с колками, в осиново-березовых колках с лугами, покосами, полях яровых, подсолнечника, кукурузы, в черных парах с мелкими колками и в пойменных лугах с покосами (0,1-0,5). В июле она обычна в черных парах с колками, осиново-березовых колках с лугами, покосами и в полях яровых с колками (1-5) и редко на ивняково-осоковых болотах (0,3), очень редко в пригородных колках с лугами (0,03). На пролете в августе эта горлица многочислена в пойменных ивняках, выпасах (17) и обычна в полях подсолнечника (8) и пшеницы с мелкими колками, в поливных полях многолетних трав с колками и на ивняково-осоковых болотах (2 и 3).

В среднем за лето большая горлица редко в лесопольных (0,7), лугово-болотных и пойменных лесолуговых ландшафтах (0,1), в среднем по району исследований во время пролета во второй половине мая очень редко (0,02); в гнездовой период и после вылета молодых птиц редко (0,3-0,9), но обычна в конце лета на пролете (3). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

БОЛЬШАЯ ГОРЛИЦА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:55 - Обновлено 29.06.2013 17:46

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 18.07.11 (Круглова Елена); 15.09.10 (Лукьянов Сергей) 22.08.10 (Коломейцев Игорь)



БОЛЬШАЯ ГОРЛИЦА

Автор: Administrator

10.11.2012 14:55 - Обновлено 29.06.2013 17:46

