# ГОРЛИЦА

Автор: Administrator
10.11.2012 15:08 - Обновлено 28.04.2015 07:35

**Описание:**

Заметно меньше сизого голубя. Преобладающая окраска рыжеватая, на спине и верхе крыльев — рыжая, голова в основном сизая, на груди винно-розовый и сизый налет. От голубей отличается более изящным телосложением, рыжеватой окраской, закругленным хвостом с белыми краями, что хорошо видно в полете. По бокам шеи зеркальце из чередования черных и белых полосок. Сходство с большой горлицей очень велико, обыкновенную следует отличать по преобладанию рыжего на спине и верхних кроющих крыльев: обыкновенная горлица выглядит сверху рыжей с темными пестринами (большая производит впечатление темной, с чешуйчатым рыжим рисунком). Если птица в руках, диагностическое отличие — в особенностях окраски крайнего рулевого пера: у обыкновенной горлицы темно-бурый цвет не заходит на внешнее опахало (рис. 5); длина крыла у обыкновенной горлицы — 18,5 см и меньше. Самцы немного крупнее самок, окраской не отличаются.

Молодые окрашены более однотонно, нет розового оттенка на груди, зеркальца на шее, ноги бурые, глаза коричневые (у взрослых — оранже¬вые). Вес 100—210 г, длина 26—-30, крыло 16,0—18,5, размах 47—55 см. [1]

**Распространение:**

Ситуация неясна. Регулярно встречалась только в пойменных местообитаниях р.Иртыш к югу от г.Омска и в окрестностях города. В колках северной лесостепи регистрируется эпизодически. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Во второй трети мая около Омска проходит пролет этой горлицы [Мекленбурцев, 1951]. Во время пролета (во второй половине мая) она многочислена в новых пойменных парках (18), обычна в пригородных осиново-березовых колках с лугами (2) и редка в поливных полях многолетних трав с колками (0,6).

В пойменных ивняках Иртыша близ пос. Красноярка Омского района 15 июня 1974 г. найдено гнездо с 2 яйцами. В гнездовой период (в первой половине июня) горлица обычна в новых пойменных парках, и во второй половине июня - в поливных полях многолетних трав с колками (8), обычна также в пригородных осиново-березово-вых колках с лугами (1) и редка на ивняково-осоковых болотах (0,1). В послегнездовой период (с первой половины июля) она обычна на кладбищах и пойменных ивня¬ках, выпасах (8 и 4) и редка в поселках городского типа (0,6). Во второй половине июля начинается ее отлет. По-прежнему она обычна в пойменных ивняках, выпасах (4), редка на клабищах и поливных полях многолетних трав с колками (0,6). В начале августа редка в осиново-березовых колках с лугами (0,1) и очень редка на ивняково-осоковых болотах (0,03). Во второй половине августа обычна на кладбищах (8) и редка в поливных полях многолетних трав с колками (0,6).

В среднем за лето горлица очень редка в пойменных лесолуговых ландшафтах (0,02), чрезвычайно редка в лугово-болотных (0,006) и лесополевых (0,004) ландшафтах, а также очень редка в парках города и в поселках (0,04). В среднем по району исследований в течение лета чрезвычайно редкий вид (0,004). В гнездовой период ее обилие возрастает (0,01) и постепенно снижается во время отлета (0,009) и пролета (0,001) в конце лета.[3]

**Литература:**

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука",

 2005.