Описание:

Сова средних размеров, с ворону, весом с голубя. Размерами и внешностью более всего похожа на ушастую сову. В отличие от нее, основной тон окраски желтоватый, светло-охристый. «Ушки» совсем короткие и лишь слегка выдаются среди прочих перьев, а чаще вообще не видны. Глаза ярко-желтые, с широкой черной окантовкой вокруг них. На нижней стороне тела только продольные пестрины, без поперечного ри-сунка; на брюхе пестрины узкие, а на груди — широкие, и в целом брюхо выглядит гораздо светлее груди. У затаившейся или испугавшейся бо-лотной совы лицевой диск становится меньше и приобретает сердце-видную форму, «ушки» торчат. От сычей отличается длинным хвостом и наличием желтых тонов в окраске. Четкого полового диморфизма нет из-за больших индивидуальных вариаций окраски. Самцы в среднем несколько мельче и белёсее самок, с менее густыми пестринами. Молодые заканчивают линьку из птенцового наряда в первый взрос-лый к августу—сентябрю, после чего выглядят как взрослые. Вес сам-цов 230—390, самок — 230—430 г, длина 34—42, крыло самцов 26,4— 33,0, самок — 27,7—33,6, размах 84—110 см. [1]

Распространение:

Населяет различные типы водно-болотных местообита-ний в области. В зоне хвойных лесов южной тайги обычна по сфагновым болотам пере-ходного типа (до 3 ос.), встречается по поймам. Как и у других сов, численность зави-сит от состояния кормовой базы, вероятно, поэтому в годы депрессии численности грызунов на остальной территории лесной зоны не обнаружена. В лесостепи населяет болота и колки, в степной зоне встречается на участках степи прибрежной части озер (до 0,4 ос.). Зимой совершает кочевки. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В начале XX в. близ Омска всюду была обычна [Коте, 1910], в середи-не века гнездилась около пойменных водоемов левобережья Иртыша [Миловидов, Шевырногов, 1977].

В гнездовой период в июне болотная сова обычна в пойменных местообитаниях: парках, ивняках, выпасах, на городских низинных болотах (1-3). Редка эта сова в пойменных лугах с покосами (0,3) и очень редка на свалках (0,05). В послегнездовой период в июле она обычна в новых пойменных парках (4) и на лугах аэропорта (1), редка в пойменных ивняках, выпасах (0,6).

В первой половине августа болотная сова по-прежнему обычна в новых поймен-ных парках и на лугах аэропорта (8), причем в последнем местообитании обилие воз-растает в 4 раза по сравнению с концом июля, обычна она во время кочевок и на свал-ках (2).

В среднем за лето болотная сова очень редка в пойменных лесолуговых ланд-шафтах (0,09) и ряде местообитаний города (0,02), в среднем по району исследований чрезвычайно редка (0,002). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Тарский район. (Виктор Кареба).

2. Омская обл. Крутинский район, близ оз.Тенис - Салтаим. 06.07.13 (Зирнит Денис)

3. Омская обл. **з**аказник "Степной" 28.06.14 (Зирнит Денис)


4. г. Омск, парк "30 лет Победы" 27.07.14 (Броскин Олег)




БОЛОТНАЯ СОВА

Автор: Administrator
10.11.2012 16:55 - Обновлено 28.04.2015 10:48









БОЛОТНАЯ СОВА

Автор: Administrator
10.11.2012 16:55 - Обновлено 28.04.2015 10:48

