

Описание:

Размером с дрозда. Окраска буровато- или рыжевато-серая с многочисленными белыми и беловатыми пятнами и пестринами. «Ушек» нет, глаза желтые. Более всего похож на мохноногого сыча, отличается от него гнездовым ареалом и местообитанием, имеет не столь рыхлое оперение, поэтому выглядит меньше, лицевой диск как бы приплюснут, на голове удлинённые белые пестрины, пальцы ног оперены только у основания. Может встретиться в одной местности со сплюшкой, отличается от нее отсутствием «ушек», плоской головой и приплюснутым лицевым диском, нет поперечного струйчатого рисунка. Различий в окраске самцов и самок нет, самки чуть крупнее.

Молодые похожи на взрослых больше, чем у других мелких сов, но все же хорошо отличаются более темной и однотонной бурой окраской туловища, пестрины выражены слабее. В сентябре—октябре надевают первый взрослый наряд и отличаются только по контактному признаку: до мая — июня маховые перья остаются птенцовыми, они мягкие и равномерно обношены, у взрослых маховые явно различаются по обношенности из-за постепенной их смены. Вес 120—220 г, длина 23—28, крыло 15,6—17,7, размах 56—61 см. [1]

Распространение:

Возможно, гнездящийся кочующий вид. Встречен 20-21 декабря 2002 г. в Омске и содержался до весны 2003 г. на городской станции юннатов [Яковлев, 2003]. Пара молодых птиц встречена нами утром 17 июля 1999 г. у открытого чердака заброшенного здания на окраине пос. Нововаршавка (северная степь).[2]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 07.08.11 (Круглова Елена).

