

Описание:

С воробья. Телосложением и манерами более всего похож на ва-ракушку, зарянку, обыкновенного соловья (размеры такие же). Верх од-нообразно оливково-бурый, на хвосте и крыльях слабый рыжеватый налет. Снизу в общем такого же цвета, но более светлый. У самца ярко- красное треугольное пятно на горле, очеркнутое по бокам контрастны-ми черно-белыми «усами», белая бровь. У самки горло белое или с розо-выми пятнышками, она похожа на обыкновенного соловья, но с более ко-ротким и закругленным хвостом, с четкой светлой бровью и темной уз-дечкой от клюва до глаза. В осеннем оперении окраска в общем та же, у самца хорошо виден красный «галстук», слегка замаскированный бе-ловатыми каемками, вся окраска более охристая или рыжеватая. Молодые сверху темно-оливковые, имеют светлые наствольные пест-рины сверху и темный чешуйчатый рисунок снизу. От молодых зарянок следует отличать по закругленному хвосту. Четких полевых отличий от молодых обыкновенных соловьев нет, ненадежно отличаются по более короткому и закругленному, менее рыжеватому хвосту. Форма крыла: 1-е первостепенное маховое перо всегда гораздо длиннее кроющих кис-ти (у обыкновенного соловья — короче), 2-е маховое короче 4-го (у обык-новенного 2-е равно 4-му или длиннее, см. рис. 7). Вес 20—30 г, длина 15—17, крыло 7,0—8,0, размах 22—26 см. [1]

Распространение:

Вид лесной зоны. В южной тайге распре-деление неравномерное: обычный или многочисленный вид левобережных (к р.Иртыш) территорий зоны (от 17 до 113 ос.), обычный или малочисленный - для правобережных территорий (около 7 ос.). Редок в увлажненных березовых лесах. В пределах подтаеж-ной зоны - многочисленный вид, населяющий заболоченные березовые леса, пойменные местообитания и межлесные болота с развитыми ивняковыми зарослями (от 56 до 100 ос.). За пределами лесной зоны вид эпизодически гнездится в северной лесостепи на удалении не более 40 км от южной границы подтаежной зоны по захламленным участ-кам березовых лесов с ивняками (менее 2 ос.); за период 1982-1996 г. зарегистрировано дважды - в 1994 и 1995 гг. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. С XX в. проходит расширение ареала этого таежного вида в Западной Сибири. Это, возможно, связано с его адаптацией к гнездованию в интразональном закустаренном поселковом ландшафте, что отмечено в приенисейской тайге [Кошкина и др., 1982]. При его продвижении к югу Прииртышья основным условием становится повышение закустаренности селитебных ландшафтов. Для соловья-красношейки в первую очередь такие подходящие гнездовые участки стали появляться в поселках и в застроенных садах пригорода. В середине XX в. этот соловей редок на гнездовании в крупных парках и на кладбищах Омска [Гынгазов, 1981].

В гнездовой период соловей-красношейка обычен в крупных поселках (7). В среднем за лето редок в крупных поселках (0,2), в среднем по району исследований очень редок на гнездовании (0,01). На агробиологической станции с 21 июля по 1 сентября 2000 г. нами пойман взрослый самец и 3 слетка. В 2004 г. здесь 1 молодая птица поймана 14 августа. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.
2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2. Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.
3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

СОЛОВЕЙ-КРАСНОШЕЙКА

Автор: Administrator

13.11.2012 04:31 - Обновлено 08.09.2015 02:37

Наблюдения:

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 07.07.15 (Круглова Елена).

