

Описание:

Чуть меньше воробья. У самца в брачном оперении верх серый, грудь светло-рыжеватая или охристая, с постепенным переходом к белому на брюшке; крылья, «маска» и конец хвоста черные, надхвостье и основание хвоста ярко-белые. Самка гораздо бледнее, «маска» нечеткая, буроватая, верх рыжевато- или серо-бурый, крылья темно-бурые, налет на груди рыжий, охристый или буроватый. Есть самки тускло окрашенные и есть яркие, почти как самцы.

Молодые от вылета из гнезда до линьки в конце лета похожи на самку, но светлее, с заметными светлыми пестринами сверху и буроватым чешуйчатым рисунком на груди. В осеннем оперении (после летней линьки) самец, самка и молодые охристо-рыжие, так как на всех свежих покровных перьях широкие рыжие каемки. Самца осенью можно узнать по немного более заметной светлой брови, темной уздечке и более четкой «маске», основной цвет крыльев и концевой полосы на хвосте — черный (у самки — бурый). Во всех нарядах хвост контрастно двухцветный, что хорошо отличает каменок от всех других птиц. В степной зоне обитают другие два вида каменок (тоже с черно-белыми хвостами), от которых самец обыкновенной каменки весной отличается серым верхом головы и спины. Самки и все птицы в осеннем наряде окрашены более сходно. В этих нарядах обыкновенную каменку следует отличать от плясуньи по более темному наряду, особенно темным крыльям, а от плешанки — по более светлому, охристому. Важнейший признак — распределение черного и белого на хвосте: у обыкновенной каменки краевая черная полоса занимает примерно треть хвоста или меньше, на крайних рулевых черное заходит вперед не дальше, чем на других перьях.

Передвигаются по земле прыжками, с резкими остановками, частыми приседаниями и подергиваниями хвостом, что характерно для всех каменок; перелетают низко над землей своеобразным танцующим полетом, при этом ярко выделяется белое пятно на основании хвоста и надхвостье. Любят присаживаться на высокие камни, бугорки, столбы, строения. Вес 18—30 г, длина 15—18, крыло 8,8—10,5, размах 28—32 см. [1]

Распространение:

В области распространена широко по солончаковым лугам, сельхозземлям на месте лугов, в окрестностях населенных пунктов, берегам горько-соленых озер в степи (до 7 ос.), везде малочисленна. Весной в южной лесостепи появляется во второй декаде апреля, улетает в сентябре. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Прилет у Омска отмечен 24 апреля 1972 г. [Гынгазов, Миловидов, 1977].

Во время пролета во второй половине мая каменка многочислена на облесенных строительных площадках с карьерами и на нефтезаводе (10-20), обычна в поливных полях многолетних трав с колками, на свалках и пойменных низинных болотах, в парках и в мелких поселках (3-8), редка в осиново-березовых колках с лугами, покосами (0,4).

Близ Омска 7 июня 1972 г. в гнезде найдено 5 сильнонасиженных яиц [Гынгазов, Миловидов, 1977]. В Барабинской лесостепи 13 июня 1899 г. молодые каменки уже летали [Иоганзен, 1907].

В гнездовой период в июне каменка также многочислена на строительных площадках с колками, пустырями, карьерами и свалках (28 и 12), обычна на нефтезаводе, в старых парках и в крупных и мелких поселках (2-4).

После появления слетков в первой половине июля каменка многочислена на нефтезаводе, лугах аэропорта и облесенных строительных площадках (16). Во время предлетных кочевок и пролета (со второй половины июля до конца августа) она по-прежнему многочислена на строительных площадках с возрастанием обилия втрое и на свалках (21), обычна в поселках городского типа (3).

В среднем за лето каменка обычна в ряде местообитаний города и в поселках (2), редка в лесопольных ландшафтах (0,1), в среднем по району исследований редка во время пролета во второй половине мая (0,9), в гнездовой период, после появления слетков и во время отлета очень редка (0,01-0,02). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.
2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.
Воробыинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.
3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 09.05.13 (Круглова Елена).
2. Омская обл. заказник. "Пойма Любинская" 20.08.13 (ST520).

3. Омская обл. Называевский р-н. близ с. Мангут (Нагорная Ирина)



КАМЕНКА

Автор: Administrator

13.11.2012 04:33 - Обновлено 02.10.2015 08:52

