

Описание:

Меньше воробья. Самец в брачном наряде легко узнаваем по рыже-коричневой спине и верху крыльев, серой голове, по красным пятнам на лбу и боках груди. У самки нет красных пятен, окраска малоприметная: верх бурый, с коричневым оттенком на спине, верху крыльев, груди и боках, на груди и боках продольные пестрины. Она похожа на самку домового воробья, отличается от нее наличием пестрин на голове и груди и более стройным телосложением; от самки чечевицы отличается также более легкой фигурой, наличием белого по бокам хвоста; от чечетки и горной чечетки, а также от самок домового воробья и чечевицы отличается белесыми наружными краями первостепенных маховых, образующими на сложенном крыле светлое поле.

У самца в осеннем перье все характерные цветовые пятна скрыты под охристо-бурыми, рыжими и коричневыми каемками перьев, он похож на самку, но в целом более рыжий, заметен контраст между коричневой спиной и буровато-серой головой, нет четких пестрин на груди и боках.

Молодые до августа — октября похожи на самку, но оперение туловища и головы более монотонно охристо-бурое, светлые каемки на внешних опахалах маховых и рулевых имеют охристый оттенок. Осенью во взрослом наряде с трудом отличимы от взрослых на расстоянии по охристому налету на светлом крыловом поле и иногда — на крайних рулевых, контактный признак — заостренные центральные рулевые. При близком осмотре можно определять осенних самцов (как годоводков, так и более старых) по наличию красного цвета на перьях головы и груди, скрытому под маскирующими каемками, его бывает немного видно и с расстояния. В брачном наряде у годовалых самцов красные пятна на груди маленькие. Вес 14—24 г, длина 13—16, крыло 7,2—8,6, размах 22—26 см. [1]

Распространение:

Весной появляется в последней декаде марта- первой декаде апреля, пролет продолжается до середины-конца апреля. Осенний пролет завершается в течение октября (в разные сезоны - в разные сроки). Гнездится только в парках г.Омска, на территории пригородных дач и некоторых райцентров области. Распределение крайне неравномерно. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В середине XX в. обычна на гнездовании в садах и на приусадебных участках одноэтажной застройки Омска [Гынгазов, 1981].

На пролете (во второй половине мая) коноплянка многочислена на городских пойменных низинных болотах (40), свалках, в садах и на лугах аэропорта (11-28), обычна в поселках городского типа, облесенных строительных площадках и в новых пойменных парках (4-9).

В гнездовой период в июне она по-прежнему многочисленна в садах, где ее обилие возрастает в 4 раза, многочислена также на пойменных низинных болотах города и облесенных строительных площадках (24-37) и обычна в пойменных парках (9), редка в поселках городского типа и на берегах пойменных водоемов (0,5).

После вылета слетков (в первой половине июля) коноплянка многочислена в более широком наборе местообитаний. Это по-прежнему сады и городские пойменные низинные болота, свалки и старые парки (52-64). Обычна в пригородных колках с лугами, на нефtezаводе, в поселках городского типа и на облесенных строительных площадках (4-8).

Во время кочевок (во второй половине июля и в августе) она становится весьма многочислена на свалках (576, обилие возрастает здесь в 9 раз), облесенных строительных площадках (220, увеличение в 55 раз) и в садах (101, возрастание в 2,2 раза). Многочислена в старых парках, пойменных низинных болотах города и в поселках городского типа (11-25), обычна на кладбищах, колках с лугами, лугах аэропорта, нефtezаводе, в районах одноэтажной застройки города и в пойменных парках (1-7).

В среднем за лето коноплянка обычна в ряде местообитаний города (8) и очень редка на берегах пойменных водоемов левобережья (0,06). В среднем по району исследований

летом очень редка (0,02) и лишь в период кочевок в августе редка (0,1). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.
Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Любинский р-н. 02.06.13. (Рысев Павел).

2. г.Омск район Асташково. 06.07.13 (Ветер)

КОНОПЛЯНКА

Автор: Administrator

13.11.2012 04:38 - Обновлено 13.06.2016 14:46

3. Омская обл. оз. близ п. Иртышский. 16.05.15 (Круглова Елена)

4. Омская. обл. Марьяновский р-н. СНТ "Заозерный" 20.07.11 (Юшкова Ирина)



КОНОПЛЯНКА

Автор: Administrator

13.11.2012 04:38 - Обновлено 13.06.2016 14:46

