

Описание:

Размером со скворца. Коренастые птицы с коротким хвостом, большой головой и массивным клювом. У самца голова коричневато-охристая, спина и малые кроющие крыла темно-каштановые. Между охристой головой и темной спиной проходит широкая серая полоса. Вокруг клюва на лбу и боках головы тянется узкая черная полоска, которая внизу доходит до черного горлового пятна. Брюшная сторона светлосерая с винным налетом. Сезонные изменения окраски незначительны, в брачном наряде клюв фиолетово-голубой (местами - до черного), к осени - желто-рогового цвета. Самка тусклее самца, с более узким черным ободком вокруг клюва, маленькими черными горловым пятном и уздечкой, шапочка и поясница более серые, винный налет на нижней стороне тела слабее. У самки цвет внешних опахал второстепенных маховых серебристо-серый, на сложенном крыле они образуют светлое поле, какого нет у самца (у него этот участок черный, с сине-фиолетовым блеском). Молодые еще тусклее самок, с желтовато-оливковой головой и округлыми темными пятнами на нижней стороне тела. Рисунок на крыле как у взрослых, но черный цвет тусклый, белые полоски на внутренних опахалах маховых перьев узкие, вершины внутренних первостепенных маховых имеют гораздо менее выраженную фигурную форму, чем у взрослых. К осени молодые линяют и становятся похожими на взрослых. Вес 40-65 г, длина 16-19, крыло 9.5-10.7, размах 31-33 см.[1]

Распространение:

Малочисленный вид пойменных ивовых лесов (уремы) р.Иртыша. Зимой малочисленный зимующий вид г.Омска, и окрестностей, появляется в октябре-ноябре. [2]

Пролетный и зимующий вид. Во второй половине века обычен во время пролета в Омске и оставался здесь на зиму [Миловидов, Шевырнов, 1977]. По другим данным [Гынгазов, 1981], в середине XX в. дубонос редок на гнездовании в крупных парках и на кладбищах Омска. Пролет его в Омске отмечен нами 17 апреля 2005 г.

ДУБОНОС

Автор: Administrator

10.11.2012 13:41 - Обновлено 17.06.2015 04:56

Во время пролета во второй половине мая и зимой дубонос обычен в новых пойменных парках (8 и 2). В среднем летом и зимой - чрезвычайно редкий вид паркав (0,009-0,002). В среднем по району исследований крайне редок (0,0001). Одна птица поймана нами на агробиологической станции 1 октября 2001 г. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.
2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2. Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.
3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. г. Омск, парк "30 лет победы" 11.10.12; 02.12.12; 08.12.12; 09.12.12; 02.11.14. 17.01.15 (Зирнит Денис) 28.12.14 (Зирнит Денис)

2. г. Омск. ул. 4-я Любинская 03.01.12. (Пожеруков Евгений)

3. г.Омск, Кировский АО, "Старый кировск", зона многоэтажной застройки. 05.02.13 (Татьяна)

4. г.Омск, парк "30 лет ВЛКСМ" 09.02.13 (ST520).

5. Омская обл. п. Чернолучье. 31.03.13 (Круглова Елена).

6. г.Омск, Центральный АО, зона многоэтажной застройки. 27.02.14 (Ветер)

7. г. Омск, пос. Московка. 30.04.14 (Галеев Олег)

8. Омская обл., сады "Сибзаводовец-2" рядом со станцией Петрушенко. 02.05.14 (Власкин Виктор)

9. 13.05.15 (Игорь Воронин)

ДУБОНОС

Автор: Administrator

10.11.2012 13:41 - Обновлено 17.06.2015 04:56



ДУБОНОС

Автор: Administrator

10.11.2012 13:41 - Обновлено 17.06.2015 04:56



фото:Кругловой Е.А.

