Описание:

Птицы плотного телосложения, большеголовые, немного мень-ше скворца. Клюв толстый, концы надклювья и подклювья перекрещива-ются. Окраска взрослого самца от малиново-красной до красно-оран-жевой, кое-где бурый налет, особенно в передней части спины. Самка зеленовато-серая, со слабым желтым налетом, поясница и надхвостье зеленовато-желтые. Крылья во всех нарядах почти монотонно-бурые. Сезонные изменения окраски самца и самки незначительны, но велики индивидуальные вариации.

Молодые в гнездовом наряде оливково-бурые, с многочисленными тем-ными наствольными пестринами, с посветлением на пояснице. Из-за ра-стянутости периода гнездования очень различны сроки смены нарядов разными особями. Молодые линяют из гнездового наряда в полувзрос-лый с мая по октябрь. В этом наряде у самцов окраска состоит из смеси желтых, оранжевых и зеленовато-бурых тонов; полувзрослые самки оливково-бурые, с наствольными темными пестринами почти по всему покровному оперению, может быть желтый налет на пояснице. Полный взрослый наряд приобретают в конце второго года жизни. В поле с трудом отличимы от клеста-сосновика, в основном потому, что увидеть клестов вблизи удается редко. Клест-еловик имеет меньшие размеры и не столь мощный клюв, который от основания идет на конус(основании надклювья и подклювья не параллельны). Форма и размеры клюва довольно изменчивы. Контактные признаки: ширина подклювья у основания меньше 13 мм, максимальная длина самого длинного ма-хового пера — 82 мм, самого длинного рулевого — 64,5 мм. Вес 29— 47 г, длина 14—19, крыло 8,9—10,4, размах 27—31 см. [1]

Распространение:

Малочисленный вид хвойных лесов южной тайги. Распределение в пределах подзоны крайне неравномерно. Наибольшая численность (7,2 ос.) отмечена в осоко-травных и осоко-сфагновых кедрачах (припойменных и плакор- ных), в июне 1997 г. в водосборе р.Б.Тава (Болынеуковский район). По правобережным притокам р.Иртыш встречали

единичных особей только в пойменных лесах. В тайге кочевки начинаются в конце июля. Осенью в южной лесостепи появляются в разные се-зоны: с конца сентября до середины декабря, весной откочевывают к концу марта-в первых числах апреля. [2]

Зимующий и кочующий вид. Зимой 1978/79 г. его виде-ли в Омске [Соловьев, 1979].

Во время кочевок во второй половине июля еловик многочислен в новых пой-менных парках с посадками сосен и елей (10). В среднем за лето чрезвычайно редкий вид новых пойменных парков с посадками хвойных деревьев (0,001), в среднем по району исследований чрезвычйно редок. П. Бертольд (P. Berthold) 24 августа 2005 г. отметил 5 еловиков, пролетающих над долиной Иртыша в Омске. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.

Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 12.03.10; 12.01.14. 17.01.14. (Круглова Елена).

2. г.Омск, парк "Советский".22.12.13 - 26.01.14 (Власкин Виктор).

3. г.Омск, парк "30 лет победы".01.02.14 (Зирнит Денис); 20.10.13 (Коломейцев Игорь).

4. Омская обл., сады "Сибзаводовец-2" рядом со станцией Петрушенко. 02.05.14 (Власкин Виктор)

5. Омская обл. Большеуковский р-н. (Давыдов Олег)

6. г. Омск сады СибНИИСХоза 20.10.16 (Леонид Анацкий)



КЛЕСТ-ЕЛОВИК

Автор: Administrator
13.11.2012 04:41 - Обновлено 28.05.2017 18:02















