

РЕЧНОЙ СВЕРЧОК

Описание:

Меньше воробья. Сверху однотонно буровато-оливковый, снизу буровато-белый. На груди размытые пестрины, которые могут образовывать продольные полосы. Перья подхвостья буровато-охристые, с широкими светлыми каемками, образующими чешуйчатый рисунок. *Отличается от обыкновенного, пятнистого и певчего сверчков монотонным, без пестрин, верхом, от соловьиного и таежного сверчков — пестринами на груди и оливковой (не коричневой) окраской верха.* Осенний наряд практически такой же, чуть светлее. Молодые в гнездовом наряде имеют желтоватый оттенок снизу, в конце лета похожи на взрослых, но немного бурее, пестрины на груди еще более расплывчатые. Вес 14—26 г, длина 13—17, крыло 6,9—8,0, размах 20—23 см. [1]

Распространение:

В подтаежной зоне встречен только в припойменных местообитаниях (3,4 ос.). В северной лесостепи эпизодически встречается в тростниковых займищах пресных озер (редок). Наибольшая численность нами отмечена для территории Степного заказника в конце мая 1997 г. Здесь встречался по зарослям крапивы и кустарников на опушках приозерных березовых колков (5,4 ос.), по залежам и тростниковым займищам пресных озер (около 13 ос.). На правобережье отмечен только в тростниках оз. Алабота (до 17 ос.). Вероятно шел пролет, так как в 1996 г. речной сверчок в первых числах июля в Степном заказнике нами не обнаружен. [2]

РЕЧНОЙ СВЕРЧОК

Автор: Administrator
13.11.2012 04:42 -

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Во время пролета (во второй половине мая и в начале июня) речной сверчок многочислен на облесенных строительных площадках и на пойменных низинных болотах в городе (12-22). Обычен в новых пойменных парках и на свалках (2).

В гнездовой период (во второй половине июня и в первой половине июля) речной сверчок обычен на облесенных строительных площадках и в новых пойменных парках (6-8), в послегнездовой период (во второй половине июля) - в новых пойменных парках (2).

В среднем за лето речной сверчок редок в биотопах поймы Иртыша и на строительных площадках (0,3). В среднем по району исследований он в предгнездовой период и во время пролета в мае и начале июня очень редок (0,02), чрезвычайно редок в гнездовой и послегнездовой периоды (0,002). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.
2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.
Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.
3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.