Описание:

Мелкий, меньше речного сверчка, с пеночку. Верх буровато- оливковый, с четкими темными пестринами. Бока светло-оливковые, горло и брюшко беловатые, немного охристые, или же весь низ желто-ватый, до явственно оливково-желтого. На перьях подхвостья темные наствольные пестрины. По бокам брюшка слабые продольные пестри-ны, более крупные на задней части туловища, на зобе перевязь из тем-ных пестрин, у одних особей более заметная, у других — менее. Руле-вые имеют сверху неясные поперечные полосы.

Наибольшее сходство с пятнистьш сверчком, тем более что, в зависи-мости от обношенности оперения, пестрины могут проявляться слабее или четче. Наиболее заметное отличие — отсутствие пестрин на груди (могут быть только на зобе и на боках). При близком осмотре видно, что темные пестрины на темени, спине и пояснице занимают только се-редину пера (у пятнистого сверчка темная вся осевая часть пера, до самой вершины), на пояснице пестрины большей частью скрыты под свет-лыми каемками соседних перьев и могут быть вообще не видны; тем-ные пестрины на перьях подхвостья — широкие у основания пера и за-остряющиеся к вершине (у пятнистого удлиненные пестрины занимают только концевую часть пера). Наличием пестрин на верхе тела отлича-ется от речного, соловьиного и таежного сверчков. Осенняя окраска практически та же. Молодые более опестрены, но дос-товерно от взрослых не отличаются, их можно спутать с пятнистыми сверчками, следует отличать по отсутствию пестрин на горле. Контакт-ный признак молодых (до отлета) — хорошо выраженные пятна на ос-новании языка (у взрослых пятен нет). Вес 10—16 г, длина 12—15, кры-ло 5,3—6,3, размах 15—19 см. [1]

Распространение:

Обычный гнездящийся вид лесостепи. В север-ной лесостепи гнездится в зарослях кустарников под пологом леса, кустарниках и бурь-янах на полянах и лугах, редко - по кромке прибрежных участков тростниковых зай-мищ озер. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В Западной Сибири сверчок харак-теризуется неравномерным распределением в пределах ареала [Рябицев, 2001]. На пролете (во второй половине мая) сверчок многочислен в пойменных ивняках, на выпасах и в поселках городского типа (40 и 19). Обычен в поливных полях много-летних трав с полезащитными полосами и с колками, в пойменных парках и лугах с покосами, на берегах пойменных озер и в осиново-березовых колках с лугами, по-косами (1-7).

В гнездовой период в июне обычен в пойменных ивняках, на выпасах и полях многолетних трав с колками (11-15), обычен в новых пойменных парках (7). В по-ливных полях многолетних трав с колками его меньше в 2,5 раза, чем в пойменных ивняках, на ивняково-осоковых болотах - в 3 раза, а в пригородных осиново-березо-вых колках с лугами и на поливных полях многолетних трав с полезащитными поло-сами - в 3,7 раза, в 5 раз меньше его в удаленных осиново-березовых колках с лугами, покосами и в пойменных лугах, покосах (3), на нефтезаводе, лугах аэропорта и на по-лях многолетних трав он также обычен (2 и 1).

После появления слетков в первой половине июля максимальное обилие сверчка отмечено в новых пойменных парках (8). Обычен он также в осиново-березовых кол-ках с лугами, полях однолетних трав с колками, в поливных полях многолетних трав с колками и полезащитными полосами, в пойменных биотопах: ивняках, лугах, парках и на облесенных строительных площадках (1-5), с началом предотлетных кочевок и пролета (со второй половины июля до конца августа) многочислен на строительных площадках и полях кукурузы (16-19), обычен на поливных полях яровых и многолет-них трав с полезащитными полосами, в пойменных парках, лугах, на открытых полях яровых и с колками (1—4), редок в колках с лугами и поливных полях многолетних трав с колками (0,2-0,3).

В среднем за лето сверчок обычен в пойменных лесолуговых (3) и лесополевых (2) ландшафтах, редок в парках, на пустырях строительных площадок (0,5) и лугово-болотных ландшафтах (0,4), а также на берегах пойменных водоемов (0,1), в сред-нем по району исследований редок (0,8), во время кочевок и пролета со второй поло-вины июля обычен до конца лета (5), пойман нами на агробиологической станции 15 и 16 сентября 2001 г. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.

Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона.15.08.09 (Круглова Елена).

ОБЫКНОВЕННЫЙ СВЕРЧОК

Автор: Administrator
13.11.2012 04:43 - Обновлено 28.04.2013 11:54

