Описание:

Немного меньше барсучка и садовой камышовки, с более ком-пактным телосложением, более округлой головой, но сравнительно длинным хвостом. Верх рыжевато-бурый, без темных пестрин и полос, поясница и надхвостье явно рыжее спины. *Шапочка тоже без резких пестрин, но. в опъчичие от тростниковой, садовой и болотной камышо-вок, немного темнее спины, особенно по бокам темени.*
Бровь белая или беловатая, широкая и длинная, далеко заходит за глаз, окологлазное кольцо выражено слабо. Низ тела беловатый, очень светлый, особенно подбородок и горло, откуда белое заходит и на бока шеи.
От барсучка отличается отсутствием темных пестрин и полос на темени и спине (верх не контрастный). От бормотушки и пеночек отличается неодно-родной окраской верха (темя темнее спины, поясница рыжая), закруг-ленным хвостом,
местообитанием (всегда недалеко от воды). Клюв от-носительно короткий, темный, нижняя челюсть у основания желтая. Самец и самка выглядят одинаково. Сезонные отличия несущественны, птицы во второй половине лета становятся более рыжими. Молодые снизу имеют сильный буроватый, рыжий или охристый налет. Контактные признаки: 1 -е первостепенное маховое заметно длиннее кро-ющих кисти; 2-е первостепенное маховое короче 5-го, расстояние от вер-шины 1 -го второстепенного махового до вершины крыла не более 15 мм; длина клюва (от ноздри) 7,0—8,5 мм. Вес 7—14 г, длина ок. 13, крыло 5,2—6,2, размах 15—18 см. [1]

Распространение:

Вид, населяющий исключительно тростнико-вые займища и сплавины озер лесостепной и степной зон, Весенний пролет завершается во второй половине мая, иногда - к середине мая. В степи на пролете многочисленный вид, на гнездовании - малочисленный. В северной лесостепи в гнездовой период много-численна (более 70 ос.). [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Во второй половине XX в. она изредка гнездилась на пойменных водоемах левобережья Иртыша [Миловидов, Шевырногов,

1977; Гынгазов, 1981]. Индийская камышевка встречена нами в тростниковых займищах озер северной лесостепи Тю калинского района 25 мая 2002 г. и в северной степи Нововаршавского района на пой-менных лугах Иртыша 30 мая 1999 г. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.

Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 27.07.13. (Круглова Елена).

ИНДИЙСКАЯ КАМЫШЕВКА

Автор: Administrator
13.11.2012 04:52 - Обновлено 19.07.2014 17:57

