

ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА

Описание:

Крупная славка, с воробья. Хорошо отличается от других птиц сходной величины «ястребиной» внешностью — поперечной полосатостью низа тела и «злыми» желтыми глазами. У самца спина темно-серая, со светлыми поперечными пестринами, особенно выраженными на плечах и надхвостье. У самки спина буровато-серая, полосы менее четкие, на середине брюшка полосатости нет. У старых самцов глаза оранжево-желтые, у годовалых самцов и старых самок — желтые, грязновато- или зеленовато-желтые, у годовалых самок — светло-коричневые или охристые.

Осенний наряд взрослых мало отличается от брачного, из-за более широких светлых каемок на спине у самца пестрины более заметны. У молодых общая окраска оперения песочно-серого цвета, полосатости снизу нет или почти нет, есть рыжеватые каемки на перьях спинной стороны, глаза серые или бурые. Молодых легко спутать с садовыми славками, следует их отличать по наличию светлых полосок на крыльях, в особенности по вершинам средних и больших кроющих и третьестепенных маховых, бывает поперечный светлый чешуйчатый рисунок на пояснице, надхвостье и темный — на боках. Кроме того, ястребиная славка крупнее и длиннохвостее. В конце лета, после линьки, полосы на нижней стороне тела и на пояснице более заметны. Вес 20—35 г, длина ок. 15—17, крыло 8,0—9,4, размах 23—27 см. [1]

Распространение:

В тайге встречали во второй половине лета на вырубках. В северной лесостепи в

качестве редкого вида встречена в захламленных уча-стках березовых колков. Статус неясен. [2]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.
Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.