Описание:

Заметно крупнее пеночки-веснички. Верх серо-зеленый, низ с от-четливым светло-желтым налетом. Более всего похожа на пеночек, осо-бенно на весничку и трещотку. Отличается от них отсутствием тем-ной полосы через глаз. Бровь, кольцо вокруг глаза и все «лицо», в т. ч. про-странство между клювом и глазом, желтые. Примечательна форма го-ловы: перья на темени приподняты и образуют округлый хохолок, пти-ца выглядит высоколобой. Ноги серые. Наиболее обычная поза — вер-тикальная.

Полового диморфизма нет. У некоторых птиц, особенно в осеннем пере и у молодых, желтизна снизу слабая. Молодые отличаются от взрослых более широкими светло-желтыми каемками на маховых, особенно на второстепенных, на сложенном крыле образуется светлое желтоватое поле. У взрослых смена маховых происходит уже на зимовках, поэтому весной они относительно ярки, а к середине лета желтые каемки снаши-ваются. Молодые улетают на юг в гнездовом наряде. Вес 11—18 г, дли-на 13—16, крыло 7,3—8,7, размах 22—26 см.[1]

Распространение:

Начало пролета совпадает с полным рас-крытием листьев, основная масса прилетает в последней декаде мая, иногда - в первой декаде июня. Населяет лиственные леса области, за исключением южной тайги, где встречается только во вторичных прииртышских лесах. В подтаежной зоне обычна, предпочитает зрелые березовые леса независимо от степени заболоченности (13-27 ос.). В северной лесостепи тяготеет к незахламленным березово-осиновым колкам (до 32 ос.).[2]

Гнездяшийся перелетный и пролетный вид. В се-редине XX в. редка на гнездовании в крупных парках и на кладбищах Омска [Гынгазов, 1981].

Во время пролета (во второй половине мая) пересмешка обычна в пригородных оси-ново-березовых колках с лугами и в пойменных ивняках, выпасах (4-7). На гнездовании в июне ее максимальное обилие отмечено в старых парках (10). В пригородных колках с лугами пересмешки меньше в 2,5 раза. Обычна она также в колках с лугами, покосами, в пойменных ивняках, на кладбищах и на облесенных строительных площадках (2).

После вылета слетков в первой половине июля максимальное обилие пересмешки отмечено на кладбищах (16). Обычна в осиново-березовых колках с лугами и в парах с колками (1-4). Во время отлета (во второй половине июля) обычна в пригородных колках с лугами, на кладбищах и в новых пойменных парках (2—4), редка в полях яро-вых (0,2).

В среднем за лето пересмешка редка в парках города (0,2), очень редка в лесополе-вых (0,08) и в пойменных лесолуговых (0,03) ландшафтах. В среднем по району иссле-дований во время пролета очень редка (0,01), в гнездовой период и после вылета слет-ков редка (0,2 и 0,1), во время отлета во второй половине июля очень редка (0,02). Мо-лодая пересмешка поймана нами 29 августа 2005 г. на агробиологической станции. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.

Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл., Азовский р-н 07.06.14 (Галеев Олег)

