Описание:

Несколько меньше воробья. Окраска однообразная, сверху буро-вато-серая, немного оливковая, без резких цветовых отметин и пестрин, снизу — беловатая, с оливково-охристъш оттенком. С близкого рассто-яния можно различить пепельно-серые пятна по бокам шеи, слабо вы-раженные полоски по вершинкам первостепенных и третьестепенных маховых. От однотонно окрашенных пеночек и бормотушки отличает-ся большими размерами и более мощным клювом, от камышовок и сверч-ков — еще и прямо обрезанным хвостом. Подкрылья охристые. Полового диморфизма нет. В осеннем пере окраска та же, но с более выраженным оливковым оттенком. Молодые очень похожи на взрос-лых, с более рыхлым и тусклым оперением, чуть более охристые или рыжеватые. Вес 14—24 г, длина ок.14, крыло 7,4—8,5, размах 20—25 см. [1]

Распространение:

В северной лесостепи появляется во второй половине мая- первой декаде июня (редко). В южной тайге в зоне хвойных лесов нами не встречена, в зоне смешанных лесов в гнездовой период обычна по вырубкам (до 70 ос.) и березовым лесам (до 15 ос,). Во второй половине лета вид встречается также в нерямовых сосня-ках, численность резко сокращается (менее 3 ос.). В подтаежной зоне обычна по зрелым березовым лесам (15-25 ос.) и припойменным местообитаниям (3,5-20 ос.). В северной лесостепи обычна в березовых колках (до 28 ос., среднемиоголетняя - 13,4), в захлам-ленных лесах - многочисленна (до 166 ос.), на осоко-кочкарниковых болотах при нали-чии участков леса малочисленна (менее 3 ос.). В степи и на граничащих со степью территориях южной лесостепи не встречена. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В середине XX в. редка на гнездовании в крупных парках и на клад-бищах Омска [Гынгазов, 1981].

Во время пролета (во второй половине мая) садовая славка многочислена в парках, садах, на облесенных строительных площадках с карьерами (12-39). Обычна на кладби-щах, в районах одноэтажной застройки города, на нефтезаводе и в колках с лугами (4—8).

Гнездо с 4 яйцами найдено на низинном болоте 2 июня 2000 г. в окрестностях пос. Дурнево Муромцевского района (северная лесостепь). В гнездовой период в июне максимальное обилие этой славки отмечено в старых парках (44). На облесен-ных строительных площадках ее в 1,6 раз меньше, многочислена она в садах, в новых пойменных парках и на полях озимых с колками (11-20), обычна в колках с лугами, на свалках, кладбищах, на лугах аэропорта, на парах и полях однолетних трав, яровых с колками, поливных и богарных полях многолетних трав с колками, пойменных лу-гах, ивняках, надпойменных ивняково-осоковых и открытых низинных болотах, в крупных поселках и на нефтезаводе (1-5), в поливных полях многолетних трав с по-лезащитными полосами редка (0,5).

Ее плохо летающие слетки найдены 12 июля 1987 г. близ пос. Тумановка. После вы-лета слетков в первой половине июля она многочислена на лугах аэропорта (64), на свал-ках, полях озимых с колками и в старых парках ее в 3 раза меньше, на облесенных строи-тельных площадках меньше в 5 раз, но здесь она также многочислена. Обычна в колках с лугами, в пойменных ивняках, на полях яровых, парах и однолетних трав с колками и нефтезаводе (1-6).

На пролете (со второй половины июля и до конца августа) эта славка многочис-лена в полях подсолнечника (53), в пойменных ивняках, выпасах ее втрое меньше. Многочислена она также в полях кукурузы, на ивняково-осоковых болотах и в ста-рых парках (11-14), обычна на облесенных строительных площадках, полях озимых с колками, на нефтезаводе и в крупных поселках (3—4), редка на поливных полях мно-голетних трав с колками и в осиново-березовых колках с лугами, покосами (0,3-0,6).

В среднем за лето садовая славка обычна в лесополевых (6) и лугово-болотных ландшафтах, а также в облесенных и закустаренных местообитаниях города (2). Ред-ка в пойменных лесолуговых ландшафтах (0,7). В среднем по району исследований в период пролета редка (0,7). В гнездовой период в июне и во время кочевок редка (0,9 и 0,8). Во время пролета птиц северных популяций со второй половины июля и до конца августа многочислена (12). Последняя садовая славка в 2000-2001 гг. поймана нами на агробиологической станции 15 сентября. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.

Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 12.08.09 (Круглова Елена).

САДОВАЯ СЛАВКА

Автор: Administrator
13.11.2012 05:04 - Обновлено 18.04.2013 06:05

