

Описание:

Камышовка средних размеров, мельче воробья. Голова выглядит полосатой из-за охристой или беловатой брови, темных полос через глаза и над бровями. На спине и темени темные пестрины (на темени — темнее), сливающиеся в продольные полосы, поясница отчетливо рыжая. Низ беловатый, с рыжими боками. *Отличается от вертлявой камышовки отсутствием яркой продольной светлой полосы посередине головы и светлых полос на спине; от индийской и других «одноцветных» камышовок — наличием темных пестрин на голове и спине.*

Самец и самка внешне неотличимы. Сезонные изменения незначительны, осенью взрослые становятся более рыжими. Молодые похожи на взрослых, но имеют темные пестрины на груди. Вес 8—19 г, длина 12—16, крыло 6,2—7,1, размах 19—23 см. [1]

Распространение:

Населяет болота различного типа и тростниковые займища озер. Прилетает во второй половине мая, осенний пролет завершается во второй декаде сентября. В тайге встречен только на заболоченных гарях во второй половине лета (менее 10 ос.). В подтаежной зоне многочисленный вид на болотах южно-западносибирского (72-365,4 ос) и барабинского типов (198 ос.), в местообитаниях иного типа (заболоченные березовые леса, осоко-гипновые болота, пойменные местообитания) его численность значительно ниже (9-23 ос.). Отмечено 4-5-кратное снижение численности в 1997 г. (снижение уровня увлажнения территории зоны) по сравнению с 1996 г. В лесостепи и степи населяет тростниковые займища (до 8 ос.) и лесостепные болота (реже). [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В середине XX в. многочислен на гнездовании на низинных болотах Омска [Гынгазов, 1981]. Прилет у Омска отмечен 16 мая 1962 г. [Гынгазов, Миловидов, 1977].

Во время пролета (во второй половине мая) барсучок многочислен на городских

пойменных низинных болотах (86) и обычен на берегах пойменных водоемов Иртыша (3). В гнездовой период в июне максимальное обилие его отмечено на пойменных низинных болотах города (134). На надпойменных ивняково-осоковых болотах он много-числен, но его обилие здесь ниже, чем на пойменных болотах, втрое. Обычен на над-пойменных открытых низинных болотах, берегах пойменных водоемов и лугов (1-9).

После появления слетков в июле и в первой половине августа больше всего его на надпойменных ивняково-осоковых болотах (91), а на пойменных низинных болотах меньше в 1,4 раза. Многочислен он также на надпойменных открытых низинных болотах (21). Обычен на полях подсолнечника (5) и редок в поливных полях яровых с полза-щитными полосами и на открытых полях яровых, а также на заливных лугах (0,2-0,6).

Во время пролета во второй половине августа многочислен на надпойменных ив-няково-осоковых и пойменных низинных болотах в городе (16-49).

В среднем за лето барсучок многочислен в лугово-болотных ландшафтах (21), редок на берегах пойменных водоемов и низинных болотах города, в лесолуговых и лесополевых ландшафтах (0,2-0,8). В среднем по району исследований на пролете очень редок (0,07), на гнездовании и после, в июле и в начале августа, обычен (1-3), как и в конце лета на пролете (1). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.
[]

Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 29.07.09 (Круглова Елена).

2. Омская обл. Омский р-н, близ д. Большекулачье 10.08.14 (Зирнит Денис)



КАМЫШОВКА-БАРСУЧОК

Автор: Administrator

13.11.2012 05:08 - Обновлено 12.08.2014 15:39

