

Описание:

Гораздо меньше воробья. Окраска верха оливково-бурая, слегка зеленоватая, снизу — буровато-белая, со слабой желтизной. Отличается от теньковки светлыми ногами, наличием желтого оттенка в оперении низа, четкой желтой бровью; от таловки, зарнички и зеленой пеночки — отсутствием полосок на крыле; от трещотки — не столь яркой желто-зеленой окраской, отсутствием четких светлых каемок на третьестепенных маховых.

Молодые от вылета из гнезда до отлета имеют отчетливо желтый низ тела и более рыхлое, чем у взрослых, оперение.

Форма крыла: 1-е первостепенное маховое перо длиннее кроющих кисти на 2—8 мм, 2-е длиннее 6-го, или равно ему, или чуть короче. Наружное опахало 6-го махового на конце не сужено. Вес 6—11 г, длина 12—15, крыло 6,1—7,4, размах 18—24 см. [1]

Распространение:

В южной лесостепи появляется в первой декаде мая. Кочевки начинаются в августе, осенний пролет завершается до середины сентября. Вид практически евритопный, избегает темнохвойные леса. В зоне хвойных лесов южной тайги населяет осиново-березовые леса (до 16 ос.) и рябовые сосняки (до 36 ос.); в зоне смешанных лесов - сфагновые и сосновые кустарничко-сфагновые болота, вырубки (20-32 ос.) и осиново-березовые леса (5-9 ос.). В подтаежной зоне населяет березовые леса (12-168 ос.), предпочитая заболоченные, болота различных типов (3,6-32 ос.), предпочитая осоко-гипновые и барабинского типа с низкорослой березой; пойменные заросли и вырубки (8-18 ос.). В северной лесостепи гнездится в осиново-березовых колках и на лесостепных болотах (29-39 ос.). В колках степи и южной лесостепи более малочисленна (до 14 ос.). [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В середине XX в. редка на гнездовании в крупных парках и на кладбищах Омска [Гынгазов, 1981].

Во время пролета (во второй половине мая) весничка многочислена в новых пойменных парках, на кладбищах и в пригородных колках с лугами (20-23).

Самец веснички добыт в Омске 6 июня 1914 г. [Лавров, 1925]. В гнездовой период в июне она многочислена в старых парках и на кладбищах (12), обычна в новых пойменных парках, пригородных колках с лугами, районах одноэтажной застройки города и на нефtezаводе (2), редка на полях яровых и озимых с колками (0,5).

После вылета слетков (в первой половине июля) многочислена на кладбищах и в пригородных колках с лугами (17-20), обычна в полях однолетних трав с колками (4).

Во время кочевок (во второй половине июля) многочислена в районах одноэтажной деревянной застройки города (29) и обычна в старых парках и кладбищах (2-3).

Во время отлета в августе весничка многочислена в пригородных колках с лугами и в садах (18-61), обычна в районах одноэтажной деревянной застройки города, кладбищах, парках (5-9), в полях кукурузы, подсолнечника, черных парах с колками и на облесенных строительных площадках (1-4).

В среднем за лето весничка обычна в ряде местообитаний города (2) и редка в лесопольных ландшафтах (0,4). В среднем по району исследований она очень редка на пролете, в гнездовой период и после вылета слетков (0,01-0,06). Лишь в первой половине августа на пролете она обычна (3) и затем вновь во второй половине августа очень редка (0,01). Последняя весничка в 2000-2001 гг. на агробиологической станции поймана нами 30 сентября. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.
Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3.
— Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 26.08.09 (Круглова Елена).

ПЕНОЧКА-ВЕСНИЧКА

Автор: Administrator

13.11.2012 05:21 - Обновлено 04.05.2013 06:20

