

Описание:

С воробья. Основной тон окраски верха — буровато- или олив- ково-серый, брюшная сторона буровато-белая, с продольными серыми пестринами. По серому верху головы тоже пестрины, еще более тем-ные. Все эти пестрины на голове и по низу тела собраны в более или менее четко выраженные продольные полосы. Самец и самка окраше-ны сходно, у самца белый цвет горла и брюшка чище. От сибирской мухоловки отличается более светлой окраской, особенно светлым лбом с отчетливыми пестринами, отсутствием светлого полушейника. От ши рококлювой мухоловки отличается наличием пестрин на голове и низе тела, отсутствием посветления вокруг глаза и между глазом и клювом. В осеннем оперении окраска та же, но с охристым оттенком. У молодых в послегнездовое время (гнездовой наряд) много светлых пестрин на перьях верха, снизу — чешуйчатый рисунок. У осенних молодых окрас-ка как у взрослых, но сохраняются светлые пятна на верхних кроющих хвоста, есть широкие светло-охристые каемки на третьестепенных ма-ховых и больших верхних кроющих крыла. Вес 13—20 г, длина 14—17, крыло 8,1—9,2, размах 23—28 см. [1]

Распространение:

В зоне хвойных лесов южной тайги не встре-чена, в зоне смешанных лесов населяет гари и вырубки, малочисленна (7-8 ос.). В подтаежной зоне населяет разреженные березовые леса (до 6 ос.), в лесостепи и степи - захламленные осиново-березовые колки (в северной подзоне - до 34 ос.).[2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В середине XX в. редка на гнездовании в крупных парках и на кладбищах Омска [Гынгазов, 1981]. Прилет у Омска отмечен 13 мая 1962 г. [Гынгазов, Милови-дов, 1977].

Во время пролета (во второй половине мая) серая мухоловка обычна в парках, пригородных осиново-березовых колках с лугами и пойменных ивняках с выпасами (4-6).

У Омска гнездо с 5 свежими яйцами найдено 12 июня 1972 г. [Гынгазов, Мило-видов, 1977]. В гнездовой период в июне эта мухоловка обычна в пригородных оси-ново-березовых колках с лугами, в районах одноэтажной застройки города, на над-пойменных ивняково-осоковых болотах и пойменных парках (1-3). После вылета слетков (с начала июля и до середины августа) она обычна в парках, на кладбищах, в удаленных от города осиново-березовых колках с лугами и на полях яровых с кол-ками (1-6).

Во время предотлетных кочевок и пролета (во второй половине августа) много-числена в парках и на кладбищах (32-40), обычна в районах одноэтажной застройки, садах и в полях озимых с колками, пригородных осиново-березовых колках с лугами и на поливных полях многолетних трав с полезащитными полосами (2-4), редка в удаленных от города осиново-березовых колках с лугами (0,1).

В среднем за лето серая мухоловка редка в парках (0,4) и в лесопольевых ланд-шафтах (0,2) и очень редка в лугово-болотных (0,09) и пойменных лесолуговых (0,01) ландшафтах. В среднем по району исследований во время пролета чрезвычайно редка (0,009), на гнездовании редка (0,2), как и после вылета слетков (0,1). В конце августа очень редка из-за отлета (0,09). Последние серые мухоловки пойманы на агробиоло-гической станции 8 сентября 2001 г.[3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.
В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2.
Воробыинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. г.Омск, парк "30 лет победы". 25.06.11. (Олег Броскин).

2. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 18.05.10; 22.07.14 (Круглова Елена).



СЕРАЯ МУХОЛОВКА

Автор: Administrator

13.11.2012 06:29 - Обновлено 02.08.2014 17:16

