Автор: Administrator
13.11.2012 06:30 - Обновлено 04.05.2014 13:55

Описание:

Меньше воробья. Окраска самцов очень изменчива. В наиболее ярком и контрастном варианте верх бархатно-черный, с широкой бе-лой полоской на крыле, белым пятном на лбу (форма лобного пятна изменчива, бывает два маленьких симметричных пятнышка), низ белый; хвост либо одноцветно-черный, либо на крайних 1—3 парах рулевых есть белые пятна или полоски. Самцы самой светлой морфы почти не отличаются от самок, имеют верх от нейтрально-серого до коричнева-то-бурого, белое пятно на лбу маленькое или его нет, окраска низа тела — от чисто-белого до грязно-белого, с буроватым или охристым оттенком; надхвостье, верхние кроющие хвоста и хвост одноцветно чер-ные, иногда на 1—3-й крайних парах рулевых есть белые пятна или по-лосы; белое пятно на крыле гораздо меньше, чем у самцов черной мор-фы. Между этими крайними типами есть много промежуточных вари-антов, бывают черные пестрины по серому верху головы. С возрастом эти цветовые морфы не связаны. Самка сверху бурая, белого на лбу нет, на зобе и груди неясные буроватые пестрины, надхвостье серое, верх-ние кроющие хвоста темно-бурые, белое пятно на крыле небольшое, может быть с охристым налетом.

В осеннем пере окраска самок практически та же, самцы окрашены как самки, но с черными верхними кроющими хвоста. Молодые в гнездо-вом наряде в общем похожи на самку, сверху более охристо-бурые, со светло-охристыми пятнами, окантованными темно-бурыми каемками, низ тела грязно-белый, часто с темным чешуйчатым рисунком на гру-ди, на третьестепенных маховых и больших верхних кроющих крыла светло-охристые каемки. У осенних молодых окраска самочья, но бо-лее желтоватая, от гнездового наряда сохраняются светло-охристые полоски на крыле.

Пеструшки, сидя на ветке, характерно потряхивают крыльями и пово-дят хвостом вверх-вниз. Есть внешнее сходство с мухоловкой-белошей- кой. В отличие от нее, у самца нет белого на задней стороне шеи, у са-мок белые основания первостепенных маховых большей частью скрыты под кроющими кисти и видна узкая полоска либо эти основания вообще не белые. Вес 11—17 г, длина 12—15, крыло 7,3—8,4, размах 22—26 см. [1]

Распространение:

В обоих подзонах южной тайги населяет в качестве малочисленного вида зрелые осиново-березовые, кедровые, сосновые и темнохвойные леса (менее 6 ос.), В подтаежной зоне и северной лесостепи местооби-тания общие с серой мухоловкой, но численность ниже (3-10 ос.). В степи и южной лесостепи в гнездовой период нами не встречена. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В середине века редка на гнездовании в крупных парках и на кладбищах Омска [Гын-газов, 1981].

В гнездовой период (в первой половине июня) мухоловка-пеструшка обычна в осиново-березовых колках с лугами, покосами (5) и во второй половине июня в по-лях яровых с колками (1). В среднем за лето это чрезвычайно редкий вид лесополе-вых ландшафтов (0,009). В среднем по району исследований в гнездовой период ред-кий (0,5) и в послегнездовой - очень редкий вид (0,04). Последние мухоловки-пест-рушки в 2001 г. пойманы нами на агробиологической станции 9 сентября.[3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2. Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. г.Омск, парк "30 лет победы". 03.04.12. (ST520).

2. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 13.05.13. (Круглова Елена).

3. г. Омск, пос. Московка. 27.04.14, 30.04.14 (Галеев Олег)



МУХОЛОВКА-ПЕСТРУШКА

Автор: Administrator
13.11.2012 06:30 - Обновлено 04.05.2014 13:55







