ВОРОН

Автор: Administrator
13.11.2012 06:42 - Обновлено 21.05.2016 19:51

Описание:

Крупная (гораздо больше вороны) черная птица. Несмотря на разницу в размерах, можно спутать с грачом и черной вороной, отли-чать следует по массивной голове с мощным клювом и «бородой» (удли-ненные и заостренные перья), относительно более узким и длинным кры-льям, отчетливо клиновидному хвосту. Единственная из наших врано- вых и воробьиных птица, которая может парить. Самец и самка внешне неотличимы, самцы несколько крупнее. Молодые похожи на взрослых, но заметно меньше и стройнее, оперение более матовое. Вес 800—1600 г, длина ок. 60—70, крыло 38,5—47,3, размах 120—150 см. [1]

Распространение:

Наибольшей численности достигает на малодоступных территориях зоны хвойных лесов южной тайги, где населяет осиново-березовые леса (до 3,3 ос.) и пойменные местообитания таежных рек (0,7 ос.10 км). К югу численность сокращается: в березовых лесах подтаежной зоны редок (до 0,1 ос.), в северной лесостепи малочислен (до 0,8 ос.). Далее на юг гнездится до южной лесостепи включительно, редок. Гнездится рано, в первой декаде июня выводки уже летные, начинается кочевка.[2]

Гнездящийся кочующий и зимующий вид. Отмечен нами 31 марта 2001 г. в пойменном парке, 4 апреля 2002 г. над Иртышом в центре Омска, 5 апреля 2002 г. около пос. Пушкино, 20 апреля 2003 г. близ пос. Загородного. На свалке близ пос. Харино 2 во-ронов наблюдали 14 декабря 1996 г. Кладка у Омска найдена 9 июня [Гынгазов, Ми-ловидов, 1977]В гнездовой период во второй половине мая ворон обычен в полях яровых и од-нолетних трав с колками (1), редок на берегах слабосоленых озер (0,3). В июле он обычен на надпойменных открытых низинных болотах (1) и очень редок в полях мно-голетних трав (0,04) во время кочевок во второй половине августа очень редок в по-лях озимых и многолетних трав с колками (0,01 и 0,05).

В среднем за лето ворон очень редок в надпойменных лугово-болотных (0,04) и лесополевых ландшафтах и на берегах слабосоленых озер (0,02). Зимой очень редок в осиново-березовых колках с лугами (0,05). В среднем по району исследований в гнездовой период редок (0,1) и очень редок после вылета птенцов (0,01), во время ко-чевок в августе становится чрезвычайно редок (0,002) и очень редок зимой (0,01). В начале XXI в. численность ворона в пригороде Омска возрастает, что подтверждает данные о врановых Европейской части России, где происходит возрастание плотно-сти их гнездовых популяций близ городов [Пономарев и др., 2004]. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2. Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Седельниковский район. близ п.Усть-Инцы. XX.06.12. (В.А.Ш.).

2. г.Омск, парк "30 лет победы" 21.02.13, 28.03.15 (Броскин Олег)

3. Омская обл. Любинский район. 24.02.13 (Зирнит Денис)

4. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 07.04.13. (Круглова Елена).

5. г. Омск, пос. Асташково, сады. 07.09.13 (Ветер)

6. Омская обл. Омский район, близ п. Хвойный. 02.03.14 (Зирнит Денис)

7. г. Омск, пос. Московка. 01.06.14 (Галеев Олег)

8. Омская обл. Омский район, близ д. Камышино. 07.09.14 (Зирнит Денис)

9. Омская обл. Омский район, близ п. Береговой. 27.09.14 (Зирнит Денис)

10. Омская обл. Муромцевский район, близ д. Артын. 25.09.14 (Зирнит Денис)

11. Омская обл. Заказник "Пойма любинская". 18.10.14. (Зирнит Денис).

12. г.Омск, близ СибНИИСХоза 12.02.15. (Броскин Олег)

13. Омская обл. Любинский район, близ д. Политотдел. 02.05.16 (Зирнит Денис).

14. Омская обл. Омский район, близ д. Подгородка (Зирнит Денис)







ВОРОН

Автор: Administrator
13.11.2012 06:42 - Обновлено 21.05.2016 19:51







