

БОЛЬШАЯ СЕНИЦА

Автор: Administrator

10.11.2012 13:53 - Обновлено 15.11.2012 02:25

БОЛЬШАЯ СЕНИЦА

Описание:

С воробья. Общеизвестная птица с желтым низом туловища и зеленой спиной. Голова черная, с большими белыми пятнами на щеках. На груди продольная черная полоса, которая у самца на брюшке расширяется. У самки желтый цвет низа бледнее, черная полоса на брюшке сужается или сходит на нет. У молодых черные элементы рисунка без блеска, желтый цвет низа грязноватый, щеки желтоватые. К концу лета молодые приобретают взрослое оперение и в первую зиму отличаются тем, что наружные края на кроющих первостепенных маховых иного цвета, чем на средних и малых кроющих второстепенных маховых (видно только вблизи). Вес 14-21 г, длина 13-17, крыло 7,0-8,2, размах 22-26 см.[1]

Распространение:

Кочующий вид. В южной тайге населяет пойменные ме-стообитания, осиново-березовые леса (до 6 ос.) и сосняки разного типа (менее 2 ос.), малочисленна. Это сохраняется и в березовых лесах подтаежной зоны (до 8 ос.). В колках лесостепи и степи обычна (26-59 ос.). Отмечали 5-7-кратные колебания численности гнездового периода в северной лесостепи и подтаежной зоне в разные годы. Зимой обычный вид лесостепных колков и населенных пунктов области. В г. Омске зимой по численности уступает только воробьям: птицы появляются в октябре, откочевывают к концу марта. [2]

Гнездящийся кочующий и зимующий вид. Максимальное обилие большой синицы пр

БОЛЬШАЯ СИНИЦА

Автор: Administrator

10.11.2012 13:53 - Обновлено 15.11.2012 02:25

и первом гнездовании (во второй по-ловине мая и в начале июня) отмечено в массивах старой кирпичной застройки и на кладбищах (45), многочислена она также в пригородных колках с лугами и в садах (18-22), в 4 раза меньше ее в районах одноэтажной застройки (13). Обычна на обле-сенных строительных площадках, поселках городского типа, нефтезаводе, в колках с лугами и парках (4-8), обычна также в мелких и крупных поселках, полях озимых с колками и в поселках (1-2), редка в полях яровых и однолетних трав с колками (0,2) и чрезвычайно редка в новых микрорайонах 5-9-этажных домов.

В послегнездовой период (во второй половине июня) максимальное обилие этой синицы отмечено в массивах старой кирпичной застройки и мелких поселках (17-18), многочислена также в пригородных осиново-березовых колках с лугами, в поливных полях многолетних трав с колками и в садах (10), обычна на нефтезаводе, в старых парках, в районах одноэтажной застройки города, на кладбищах и в полях многолетних трав с колками (5-9), а также в колках с лугами, поселках городского типа, и в по-лях озимых с колками (3-4).

При втором гнездовании (в июле) больше всего большой синицы в пригородных осиново-березовых колках с лугами и старых парках (49), многочислена она также в районах старой кирпичной многоэтажной застройки и на кладбищах (28-30), в осиново-березовых колках с лугами, садах, пойменных парках и парах с колками (11-14), обычна в поселках городского типа, районах одноэтажной застройки города и в полях однолетних трав с колками (5-9), а также в полях яровых и многолетних трав с колками, на ивняково-осоковых болотах и в крупных поселках (1), редка в полях озимых с колками (0,5).

В первой половине августа эта синица весьма многочислена на кладбищах (100), многочислена в новых пойменных парках, в садах, в районах одноэтажной и кирпичной застройки и в колках с лугами (28-64), в старых парках и полях яровых с колками (21-24), а также на нефтезаводе, облесенных строительных площадках и в полях однолетних трав с колками (10-16), обычна в поливных полях многолетних трав с колками, осиново-березовых колках с лугами, надпойменных ивняково-осоковых боло-тах и в пойменных ивняках (2-9), редка на выгонах (0,6).

В период кочевок во второй половины августа она весьма многочислена на кладбищах (132), многочислена в садах и старых парках (78-88), в новых пойменных парках, на нефтезаводе и в поселках городского типа (22—44), обычна в осиново-березовых колках с лугами, в полях яровых с колками, на надпойменных ивняково-

БОЛЬШАЯ СИНИЦА

Автор: Administrator

10.11.2012 13:53 - Обновлено 15.11.2012 02:25

осоко-вых болотах, в районах одноэтажной застройки города и мелких поселках (4-7), обычно также в поливных полях яровых с полезщитными полосами (2).

В среднем за лето большая синица обычно в парках города (9) и в лесопольевых (1) и редко в лугово-болотных ландшафтах (0,5), чрезвычайно редко в пойменных лесо-луговых ландшафтах (0,006).

Зимой эта синица весьма многочислена в поселках городского типа (554) и крупных селах (118). В городах, в массивах старой кирпичной застройки ее обилие меньше в 1,4 раза по сравнению с поселками городского типа, в старых парках и районах од-ноэтажной деревянной застройки - меньше вдвое, на кладбищах и в новых микрорай-онах - втрое. Многочислена в садах, пригородных колках с лугами и пойменных ив-няках (54-88), а также в пойменных парках, на облесенных строительных площадках, мелких поселках и на нефтезаводе (15—40), обычно в полях с мелкими колками (2).

В среднем по району исследований большая синица при первом гнездовании и затем во время кочевок после первого гнездования редко (0,8 и 0,5), при втором гнездовании и во время кочевок обычно (2 и 1), как и зимой (5). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2. Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

БОЛЬШАЯ СИНИЦА

Автор: Administrator

10.11.2012 13:53 - Обновлено 15.11.2012 02:25

З. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Любительские наблюдения:

г. Омск на улицах и в парках, по области (круглый год 2011, 2012)

