Описание:

Меньше большой синицы. Оперение большей частью белое, с серыми и голубыми у частками на голове, спине, крыльях и хвосте. Самец и самка выглядят сходно, но у большинства самцов голубой цвет несколько темнее и более насыщенный. Сезонные изменения окраски несущественны. У молодых в гнездовом наряде нет голубого цвета на голове и спине, он заменен буровато-серым, на брюшной стороне бывает желтоватый налет. К осени становятся похожими на взрослых, и до следующего (2-го календарного) лета отличаются тем, что кроющие первостепенных маховых у них голубовато-серые, отличаются от остальных (голубых) верхних кроющих крыла. У более старых птиц все кроющие крыла одного цвета - голубые. Вес 10-16 г, длина 12-15, крыло 6,1-7,3, размах 19-22 см.[1]

Распространение:

Обычный вид лесостепной зоны. Севернее встречали только в пойменных местообитаниях рек подтаежной зоны. В северной лесостепи населяет ивняковые заросли лесостепных болот (до 5 ос.) и березовых колков (до 55 ос.). Отмечали 3-кратные колебания численности гнездового периода в разные годы. В степи и южной лесостепи не встречали. Зимой малочисленный вид южной лесостепи. [2]

Гнездящийся кочующий и зимующий вид. В гнездовой период (со второй половины мая и в первой половине июня) князек многочислен в старых парках (12) и обычен в осиново-березовых колках с лугами (2-8). После вылета слетков (со второй половины июня) обычен в старых парках (2). Во время кочевок в июле многочислен в пригородных колках с лугами, где его обилие возрастает в 3 раза и в 6 раз - в старых парках (12). В удаленных осиново-березовых колках с лугами с покосами обычен (2). В августе многочислен на надпойменных ивняково-осоковых болотах (18) и обычен на облесенных строительных площадках (8), в крупных и мелких поселках и на полях подсолнечника (2).

В среднем за лето князек обычен в лугово-болотных ландшафтах (2), редок в лесо-полевых ландшафтах и в парках города (0,2 и 0,7). Зимой он многочислен в пойменных ивняках и на облесенных строительных площадках (24-28) и обычен в полях с мелкими колками (2). В среднем по району исследований он редок в гнездовой период (0,2). После вылета молодых и откочевки становится крайне редок (0,0003), вновь редок в конце лета во время послегнездовых перемещений (0,7), зимой обычен (1). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2. Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1.г. Омск, Парк "30 лет победы" Январь 2012; Декабрь 2012; Февраль 2012. (Зирнит Денис) Март 2012 (Власкин Виктор). Ноябрь 2013 (Власкин Андрей).

2.г.Омск, природный парк птичья гавань. Весна 2011; Осень 2012. (Зирнит Денис).

3. Омская обл. г. Исилькуль. 28.02.15 (Рысев Павел).

Встречается в парках и на улицах города круглый год.



БЕЛАЯ ЛАЗОРЕВКА

Автор: Administrator
10.11.2012 13:56 - Обновлено 31.03.2015 09:04



