

Описание:

Рябинник отличается от других дроздов окраской верха: серые голова и низ спины до надхвостья, по верху спины и основанию крыльев - каштаново-коричневая "мантия", хвост темно-бурый, гораздо темнее остального верха, подкрылья белые. Грудь бледно-рыжая, остальная часть низа белая. На груди и боках тела резкие черные пестрины. Самка слабо отличается от самца буроватыми тонами на серых участках оперения, менее ярким коричневым цветом на спине, менее четкими пестринами снизу. Сезонные изменения в окраске незначительны и выражаются в более тусклых красках всего оперения осенью, клюв также становится вместо желтого (у основания) буровато-охристым. Молодые сверху пестрые, их наиболее четкий отличительный признак от других дроздов - темный хвост, к концу лета становятся похожими на взрослых, но с более тусклой окраской. Характерна манера при беспокойстве задирать хвост вверх. Вес 75-130 г, длина 22-29, крыло 13,6-15,2, размах 40-46 см.[1]

Распространение:

Частично зимующий вид. В южной тайге места гнездования связаны с пойменной уремой Иртыша (более 8 ос.; 2,8 колонии, на 100 км² поймы), в междуречьях не встречается. В подтаежной зоне гнездится по березовым лесам дисперсно или колониями, численность варьирует по годам (менее 1 ос. в 1996 г.; 13-25 ос. в 1997 г.). В северной лесостепи населяет незаболоченные колки. Гнездование дисперсное (1, 8-24, 2 ос., среднемноголетняя 5,2 ос.) и колониальное (12, 3-24, 7 колонии). В степной зоне гнездится в пойменной уреме Иртыша (29, 2 ос.; 2 колонии на 100 км² поймы). Существуют две постоянные колонии в черте г. Омска. Весенняя миграция проходит в апреле, осенняя завершается не позднее первой декады октября. Зимой (с октября по апрель) - обычный (в отдельные годы - массовый) вид города и окрестностей, райцентров юга области. [2]

Гнездящийся кочующий и зимующий вид. Насиживание в четырех гнездах этого дрозда близ Омска отмечено 7 и 20 мая 2000 и 1999 г. В гнездовой период в перв

ой половине июня обычен в полях многолетних трав с колками (4) и редок в полных полях многолетних трав с колками (0,2). В начале XX в. появление его птенцов отмечено в середине июня [Лавров, 1925]. Два нелетающих молодых рябинника найдены 22 мая 1990 г. и 17 июня 1991 г. в Омске.

Во время появления слетков во второй половине июня он по-прежнему обычен на полях многолетних трав с колками (1) и редок на кладбищах (0,2), во время кочевок со второй половины июля до конца августа многочислен в новых пойменных парках (14), редок в осиново-березовых колках с лугами, покосами и парах с колками (0,6), полях однолетних трав с колками (0,3) и очень редок в полях многолетних трав с колками (0,03).

В среднем за лето рябинник очень редок в лесопольных ландшафтах (0,03) и чрезвычайно редок в парках города (0,007).

В 1920 г. последняя стайка птиц отмечена 27 октября [Лавров, 1925]. Позднее с зимы 1973/74 г. рябинник стал оставаться на зиму в Омске, кормясь плодами яблон и рябины. Переживает этот дрозд морозные дни на участках земли, свободной от снега над теплотрассами города.

Зимой рябинник весьма многочислен в районах одноэтажной деревянной застройки (592), на кладбищах и в старых парках его меньше в 2,1 и 2,4 раза, многочислен также в застроенных садах (41), новых пойменных парках, пойменных ивняках (25 и 21), крупных поселках и на нефтезаводе (19 и 10), обычен на облесенных строительных площадках, в мелких поселках (4 и 3) и очень редок в полях с колками (0,2).

В среднем по району исследований рябинник в гнездовой период очень редок (0,01), во время кочевок со второй половины июля редок (0,2) и затем крайне редок в конце августа (0,0004). Осенью 2000 и 2001 гг. это самый обычный из дроздов пойманных на агробиологической станции. Зимой рябинник обычен (3). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2. Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Любительские наблюдения:

РЯБИННИК

Автор: Administrator

10.11.2012 13:57 - Обновлено 31.03.2015 03:41

г. Омск на улицах и в парках, по области (круглый год 2011, 2012). В жилой зоне зимой встречается чаще, чем летом. Летом чаще встречается в парках омска и прилегающих к городу лесах.



РЯБИННИК

Автор: Administrator

10.11.2012 13:57 - Обновлено 31.03.2015 03:41

