Автор: Administrator
10.11.2012 14:00 - Обновлено 04.05.2013 06:19

ПЕНОЧКА-ТЕНЬКОВКА

Описание:

Немного меньше веснички. В нашем регионе обитает 2 подвида, внешне отличающиеся очень слабо.

Сибирская теньковка — Ph. c. tristis (по другой номенклатуре — fulvescens) — буровато-серая, оливковые или зеленоватые тона в опере-нии выражены слабо, больше — в осеннем пере (особенно на надхвостье); желтое (от ярко-желтого до бледно-желтого) есть только в окраске подкрыльев; бровь охристая или светло-бурая, без явного желтого от-тенка, кольцо вокруг глаза беловатое; ноги черные, с желтыми подо-швами.

Восточноевропейская теиьковка — Ph. c. abietinus в общем такой же ок-раски, спина бурая, но на ней есть более оливковые или зеленоватые участки, что особенно заметно на надхвостье; на груди слабые сернис-то-желтые пятна; подмышечные перья сернисто-желтые; бровь белова-тая, с желтым оттенком; кольцо вокруг глаза желтоватое; ноги черные или буровато-черные.

В зоне контакта подвидов очень обычны птицы гибридного происхож-дения, переходной внешности. Птицы обоих подвидов отличаются от дру-гих пеночек бурой окраской, темными ногами, слабо выраженной бровью. В осеннем оперении может быть чуть заметная крыловая полоска. Мо-лодые отличаются от взрослых более выраженными зеленым и желтым тонами.

Форма крыла: первое маховое длиннее кроющих кисти на 5—9 мм, 2-е маховое короче 6-го (обычно между 7-м и 8-м), наружное опахало 6-го имеет на вершине сужение. Вес

6—10 г, длина 10—13, крыло 5,5—6,7, размах 17—20 см.[1]

Распространение:

Ph.collybita (tristis). В области (судя по песне) встречается только этот подвид. Вид практически евритопный. Весной прилетает в.последней декаде апреля-первой декаде мая, осенью пролет завершается в первой декаде октября. В зоне хвойных лесов южной тайги обычна для березовых и темнохвойных лесов, кедрачей (18-25 ос.), малочисленна в рямах и на болотах (до 5 ос.); в зоне смешанных лесов обычна в ягодниковых. сосняках, березовых лесах и на вырубках (14-69 ос.), малочисленна в рямах, кедрачах и на болотах (3-10 ос.). Во второй половине июля происходит откочевка вида и резкое сокращение численности (менее 2 ос.). В подтаежной зоне обычна по березовым лесам (до 14 ос.); в северной лесостепи - по лесостепным болотам и березовым колкам (10-34 ос.), предпочитая захламленные участки. В колках степи и южной лесостепи малочисленна. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Пролет теньковки в пос. Загородный отмечен 3 мая 1996 г. В районах старой кир- [чной застройки Омска ее мы слышали и 6 мая 1988 г. Около Омска 12 июня 1972 г. в езде найдено 5 слепых птенцов [Гынгазов, Миловидов, 1977].

На пролете (во второй половине мая) максимальное обилие теньковки отмечено в новых пойменных парках и на кладбищах (30-49). Многочислена она также в пойменных ивняках, в пригородных осиново-березовых колках с лугами, старых парках сад ах (24-32) и в удаленных от города колках с лугами и на облесенных строительных площадках (12), обычна в районах одноэтажной застройки города, на полях озимых, яровых и многолетних трав с колками (1-8).

В гнездовой период (в июне и во второй половине июля) теньковка отмечена в новых пойменных парках и на кладбищах (34-47), многочислена в пойменных ив- иках, в пригородных осиново-березовых колках с лугами и старых парках (22-30), Зычна в садах, в колках с лугами, облесенных строительных площадках, в районах цно

этажной застройки города, на полях озимых, яровых и многолетних трав с кол- ши и на берегах пойменных водоемов (1-8), редка в полях яровых, однолетних эав, ч ерных парах с колками, поливных полях многолетних трав с колками, в круп- ых п оселках и на полях с колками (0,5-0,7).

После вылета слетков (со второй половины июля до середины августа) макси- аль ное обилие теньковки отмечено в новых пойменных парках, пригородных оси- ово- березовых колках с лугами и на кладбищах (24-26). В пойменных ивняках, вы- асах ее вдвое меньше, чем в пойменных парках. Обычна она на полях яровых с кол¬а ми, надпойменных ивняково-осоковых болотах, облесенных строительных пощадках, в колках с лугами, на полях озимых и многолетних трав с колками и в стар ых па рках (1-5). Минимальные показатели обилия отмечены для черных паров колками и на берегах пойменных водоемов (0,5).

На пролете (во второй половине августа) максимальное обилие теньковки отме- гн о в новых пойменных парках (58). В пригородных осиново-березовых колках с угам и ее обилие меньше в 1,7 раза, на кладбищах - в 2,4 раза. Здесь она тоже мног о- ислена, обычна в пойменных ивняках, на ивняково-осоковых болотах, в садах, н а элесенных строительных площадках и в старых парках (2-6), минимальные показ арли отмечены для колков с лугами и берегов пойменных водоемов (1).

В среднем за лето теньковка обычна в парках города (2) и редка в лугово-болотн ых (0,9), лесополевых (0,7) и в пойменных лесолуговых ландшафтах, а также на б ерегах пойменных водоемов (0,4). В среднем по району исследований обычна во в ремя ролета и на гнездовании (4), после вылета слетков и во время отлета редка (0,9 и 0,1). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд- во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2. Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. г. Омск, озера по ул. Заозерной. 14.04.12 (Зирнит Денис)

2. Омская обл., сады "Сибзаводовец-2" рядом со станцией Петрушенко. 01.07.12. (Власкин Виктор)

3. г.Омск, парк "30 лет победы" 02.09.12. (Броскин Олег)

4. г.Омск, парк "Советский" 27.04.13 (Власкин Виктор)







ПЕНОЧКА-ТЕНЬКОВКА

Автор: Administrator
10.11.2012 14:00 - Обновлено 04.05.2013 06:19



