СЕРАЯ СЛАВКА

Описание:

Серая славка - небольшая, меньше воробья, птичка. Окраска преимущественно серая, верх крыльев рыжий (широкие рыжие каемки на больших кроющих и внутренних маховых), горло чисто белое. От славки-завирушки отличается более светлой шапочкой, рыжим верхом крыла, четким белым колечком вокруг глаза, охристыми ногами, длинным хвостом, более крупными размерами. Подкрылья серые. Самец и самка окрашены сходно, но у самца весной часто бывает розовый налет на боках и груди, на крайних рулевых наружные опахала чисто белые, у самки явного розового оттенка на оперении нет, наружные опахала крайних рулевых бледно-охристые или светло-коричневые. У самки шапочка не столь чисто серая, буроватая, глаза у самца светло-коричневые, у самки - бурые или коричнево-бурые. Молодые похожи на взрослых, но с охристым оттенком на всем оперении, в том числе и на горле. Рыжие каемки на перьях крыла - наиболее важное диагностическое отличие от садовой славки и славки-завирушки. Вес 12-20 г, длина ок. 14, крыло 6,7-8,1, размах 18-23 см.[1]

Распространение:

Населяет все ландшафтные зоны области, В северной лесостепи появляется в первой-второй декадах мая, редко позднее. В зоне хвойных лесов южной тайги населяет пойменные местообитания, осиново-березовые леса (до 14 ос.); залежи, вырубки и переходные болота (до 8 ос.), избегает хвойные леса. В зоне смешанных лесов южной тайги встречается на вырубках, гарях (9-25 ос.), сосно¬вых кустарничко-сфагновых болотах (до 37 ос.) и в пойменных зарослях. Во второй половине лета на вырубках и гарях отмечали 10-кратное возрастание численности при снижении в

 других местообитаниях. В северной лесостепи обычна в осиново-березовых колках (27-68 ос,), предпочитая захламленные участки леса, и на лесостеп¬ных болотах (до 40 ос.). В степи и южной лесостепи обычна по березовым колкам (до 34 ос.). [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Во время пролета (во второй половине мая) серая славка весьма многочислена на свалках (126), в пойменных ивняках так же многочислена, как и в массивах кирпич¬ной и одноэтажной деревянной застройки, в старых парках и на облесенных строи¬тельных площадках (30-81). На кладбищах, в пойменных парках, на нефтезаводе, в колках с лугами и в мелких поселках ее обилие меньше в 6 раз. Обычна она в приго¬родных колках с лугами, на лугах аэропорта, в поселках городского типа, на полях озимых и поливных полях многолетних трав с колками (1-8).

В гнездовой период в июне максимальное обилие этой славки отмечено на облесенных строительных площадках с карьерами (74), многочислена в старых парках, поселках: крупных и городского типа, в садах, в пойменных ивняках и парках, на над¬пойменных ивняково-осоковых болотах и в пригородных колках с лугами, полях озимых и многолетних трав с колками и на свалках (22-26). Многочислена также на кладбищах и в полях однолетних трав с колками (10-12). Обычна в поливных полях многолетних трав с полезащитными полосами и колками, в районах одноэтажной за¬стройки, на нефтезаводе, в мелких поселках, в парах и полях яровых с колками, в оси-ново-березовых колках с лугами и покосами, в пойменных лугах и на берегах пойменных водоемов (2-9).

После вылета слетков в июле максимальное обилие ее отмечено в старых парках и на строительных площадках с колками (95 и101). На свалках ее обилие ниже вторе, многочислена она также в новых пойменных парках, надпойменных низинных болотах, ивняках, поливных полях яровых с полезащитными полосами, в пригородных колках с лугами и в садах (15-32), обычна в полях подсолнечника, на агроценозах с колками, в колках с лугами и в мелких поселках (4-7). Минимальные показатели ее обилия отмечены в парах, полях яровых с колками и без таковых, на нефтезаводе, в поселках городского типа, на ивняково-осоковых болотах и кладбищах (1-2).

В период кочевок и отлета в августе максимальные показатели обилия отмечены на свалках (213), на облесенных строительных площадках ее меньше вдвое. Много¬числена она на надпойменных ивняково-осоковых болотах, в садах и старых парк

ах (28-53), в пойменных ивняках, низинных болотах и в пойменных парках ее меньше (12), обычна в поливных полях многолетних трав с колками, полях озимых с колками и в осиново-березовых колках с лугами (5-9) и на полях яровых с колками (1), редка на берегах озер поймы Иртыша (0,5).

В среднем за лето серая славка многочислена в городских парках (13), обычна в надпойменных лугово-болотных (8), пойменных лесолуговых и надпойменных лесо-полевых ландшафтах (2) и редка на берегах пойменных водоемов (0,3). В среднем по району исследований обычна на пролете, в гнездовой период и после вылета с летков (5 и 3), а также во время кочевок и отлета (2). Последняя серая славка в 2000-2001 гг. на агробиологической станции поймана нами 1 сентября. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2. Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1.г.Омск, парк "30 лет победы". 21.04.12 (Олег Броскин)

2.Омская обл. д. Красная горка. 31.05.12 (Зирнит Денис)



