СОРОКА

Описание:

Сорока – хорошо известная птица, имеющая контрастную черно-белую окраску и длинный ступенчатый, во время полета принимающий веерообразный вид. Взрослые самец и самка окрашены сходно. Голова, грудь, спина, кроющие крыла, хвост и перья голени бархатисто-черные с металлическим отливом, особенно на хвосте, пурпурового, синего и зеленого оттенков. Брюшко, бока, поясница и плечи чисто белого цвета. Первостепенные маховые двухцветные: внешние узкие опахала черно-серые, внутренние белые с серой каемкой в вершинной части и у основания. Второстепенные маховые черные, с сильным зеленовато-синим металлическим отливом. Испод крыла черно-бурый. Хвост длинный, ступенчатый, шиферно-черный снизу и с ярким металлическим отливом зеленого и фиолетового цвета сверху, особенно хорошо выраженным у самцов. Все оперение мягкое и густое. Клюв и ноги черные. Радужина темно-коричневая. Молодые отличаются рыхлым оперением без блеска, с заметным буроватым налетом. Первое маховое перо длиннее и шире, чем у взрослых. Вес 195-314 граммов, крыло 188-218, хвост 222-309 мм.[1]

Распространение:

Оседлый вид. В таежную зону проникает только по вторичным лесам вокруг агроландшафтов и по поймам таежных рек, где очень редка (менее 0,3 осАЮ км2), и по пойме р.Иртыша. В березовых лесах подтаежной зоны редка (1 ос.), в агроландшафтах обычна. В лесостепи и степи обычный, местами многочисленный вид березовых колков (до 13 ос.) и лесостепных болот (до 6 ос.). В северной лесостепи отмечены 10-кратные вариации численности в разные годы. [2]

Гнездящийся кочующий и зимующий вид. Строительство гнезд в Омске в 1997 г. нами отмечено 18 марта, а в 1978 г. - 30 марта. В 2001 и 2005 гг. она на гнездах найдена 8 и 10 апреля. Гнездо сороки с сырой почвой, но еще без яиц, найдено в окрестностях Омска 28 апреля 1974 г.

В гнездовой период (во второй половине мая и первой половине июня) макси¬мальное обилие сороки отмечено на кладбищах и в пригородных колках с лугами (237 и 220). Весьма многочислена она в пойменных парках и на свалках (127 и 174), в менее закустаренных старых парках ее меньше в 2,3 раза по сравнению с пойменны¬ми парками, многочислена в садах, на закустаренных строительных площадках, в пойменных ивняках и на нефтезаводе (50-92), в районах кирпичной и деревянной застройки города, на поливных полях многолетних трав с колками, в мелких поселках и на лугах аэропорта (25-43). В крупных и поселках городского типа и на Иртыше за городом ее обилие в 14 раз меньше, чем на кладбищах. Также много числена она в колках с лугами, покосами, пойменных лугах и на полях многолетних трав с колками (10-12). Обычна на различных облесенных агроценозах и на берегах р. Омь в городе, надпойменных ивняково-осоковых болотах (5-7), берегах пойменных озер, черных парах, на бетонированной набережной Иртыша и полях яровых (1-4), редка на открытых низинных болотах и на полях многолетних трав (0,1-0,3) и чрезвычайно редка в новых городских микрорайонах (0,001).

Вылупление птенцов сороки в Марьяновском районе отмечено нами 8 июня 1991 г. Сорочата вне гнезда встречены в новых пойменных парках 9 июня 1986 г. и 17 июня 1992 г.

После вылета слетков со второй половины июня до середины июля максимальное обилие отмечено, как и в гнездовой период, на облесенных кладбищах, в пригородных колках с лугами и в пойменных парках (224-269). Несколько меньше в это время ее на облесенных строительных площадках, свалках, садах и в старых парках (117-174). Многочислена в пойменных ивняках, в районах старой кирпичной и одноэтажной деревянной застройки (52-96), на поливных полях многолетних трав с колками, на закустаренных берегах Иртыша за городом и на нефтезаводе (22-33), также многочислена в колках с лугами, покосами, на различных агроценозах с колками, в поселках: крупных и городского типа, а также на пойменных лугах (12-15), обычна на берегах р. Омь, на полях однолетних трав и парах с колками, на надпойменных ив¬няково-осоковых болотах и в мелких поселках (7-9), столько же ее на берегах пой¬менных водоемов, в новых городских микрорайонах, на полях озимых и яровых с колками, на выгонах, городских пойменных и удаленных надпойменных

низинных болотах и на полях кукурузы (1-6), редка на полях многолетних трав, черных парах, полях подсолнечника, заливных лугах и лугах аэропорта (0,3-0,6).

Во время кочевок (со второй половине июля и в августе) ее максимальное оби¬лие отмечено на свалках, кладбищах (152-155) и на участках старой кирпичной застройки (136). В районах одноэтажной деревянной застройки города сороки вдвое меньше, чем на кладбищах. Также многочислена она в парках, мелких поселках, облесенных строительных площадках, садах (62-88), на берегах Иртыша, в пойменных ивняках, в новых городских микрорайонах, в крупных поселках и на поливных полях многолетних трав с колками (18-33). В пригородных колках с лугами, на берегах Оми, в поселках городского типа, на нефтезаводе и на полях яровых с колками ее меньше, но здесь она тоже многочислена (10-16), обычна в колках с лугами, в по¬ливных полях многолетних трав с полезащитными полосами и колками, лугах аэропорта, заливных лугах и надпойменных ивняково-осоковых болотах (5-9), а также в полях с колками и полезащитными полосами, на надпойменных открытых низинных болотах, в пойменных лугах, на выгонах и на берегах пойменных озер (1-4), редка на пойменных низинных болотах, полях яровых, кукурузы, многолетних трав и черных парах (0,1-0,8).

В среднем за лето максимальное обилие сороки отмечено в закустаренных и облесенных биотопах города и в поселках (47), многочислена она и на закустаренных берегах рек (18), обычна в пойменных лесолуговых (9), лесополевых и лугово-болот-ных ландшафтах (3) и на берегах озер (1).

Максимальное ее обилие зимой отмечено в поселках городского типа и в районах одноэтажной деревянной застройки города (600-676), на кладбищах обилие сорок и ниже, чем в поселках городского типа в 1,3 раза, а в пригородных осиново-березовых колках с лугами - вдвое. Также весьма многочислена она в пойменных парках, на свалках, участках старой кирпичной застройки и в крупных поселках (304-312). В садах обилие ее по сравнению с поселками городского типа ниже в 2,3 раза, в старых парках - в 3,2 раза. Весьма многочислена в приречных ивняках и на облесенных строительных площадках (120 и 156). Зимой многочислена в мелких поселках, в новых микрорайонах города (64-72), на городских низинных болотах и на нефтезаводе (18-26), обычна в осиново-березовых колках с лугами, полях с колками и на пойменных лугах (3-8).

В среднем по району в гнездовой период и после вылета птенцов сорока обычна (4-5). Во время кочевок (со второй половины июля и в августе) ее несколько мень

ше (3), а зимой в 4 раза больше, возможно, из-за подкочевки сорок из северной лесостепи (12). Тоже установлено ранее для этого сезона, что во всех типах антропогенных ландшафтов Палеарктики плотность населения сороки максимальна [Константинов и др., 2004]. В сильные морозы зимы 1975/76 г. сорока вместе с галкам и отмечена нами на Оми и Иртыше в районе ТЭЦ-1 возле полыней с теплой водой. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 2. Воробьинообразные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Любительские наблюдения:

Повсеместно в омске и области (круглый год).

СОРОКА

Автор: Administrator
10.11.2012 14:15 - Обновлено 15.11.2012 02:54



