КРУГЛОНОСЫЙ ПЛАВУНЧИК

Автор: Administrator

10.11.2012 17:31 - Обновлено 18.04.2017 07:56

Описание:

Чуть больше воробья. В окраске спины преобладает сизо-серый цвет с охристыми пестринами, сливающимися в продольные полосы. На боках шеи рыжие пятна, горло и брюшко белые. Клюв полностью темный, шиловидный (см. рис. 4). Как правило, самцы гораздо бледнее самок, но их индивидуальная окраска очень различна, некоторые сам-цы яркие, и отличать их от самок надо по наличию на темном темени рыжеватых пестрин. У самок темно-сизая голова, без пестрин, рыжие пятна на шее более яркие. В брачном наряде сходных видов нет. Во всех нарядах на раскрытом крыле сверху широкая белая полоса, бока над-хвостья белые.

В зимнем пере, которое взрослые начинают приобретать в июле — ав-густе, с большими индивидуальными вариациями, низ белый, верх се-рый, на глазу и за глазом удлиненное темное пятно. С большого рас-стояния осенью от плосконосого плавунчика следует отличать по тем-ной спине.

Молодые сверху темно-бурые, с широкими рыжими каемками на перь-ях спины; на шее, груди и боках интенсивный розовато-бурый налет, шапочка темная. От молодых плосконосых плавунчиков их следует от-личать по тонкому клюву и большому глазному пятну. На осенней миг-рации многие молодые начинают линять в зимнее перо и становятся похожими на взрослых, но темя остается очень темным. Вес 20—53 г, длина 18—19, крыло 10,2—11,8, размах 31—34 см. [1]

Распространение:

Во время весеннего и осеннего пролета встречается на пресных водоемах лесной и лесостепной зон области группами менее 10 птиц. Во второй половине мая 1998 г. наблюдали кратковременную остановку (менее 2 суток) пролетных скоплений (более 2000 птиц) на оз. Атаичье (Степной заказник). В се-верной лесостепи весенний пролет наблюдаем между 20 мая и 15 июня, как правило группами менее 10 птиц. Осенние

КРУГЛОНОСЫЙ ПЛАВУНЧИК

Автор: Administrator 10.11.2012 17:31 - Обновлено 18.04.2017 07:56 кочевки - с первой декады августа, пролет завершает-ся к середине сентября. [2] Пролетный вид. Во время весеннего пролета (в первой половине июня) круглоносый плавунчик обычен на слабосоленых озерах (2), как и во второй половине августа во время летних кочевок (3). В среднем за лето круглоносый плавунчик редок на озерах (0,7), в среднем по району исследований чрезвычайно редок во время весеннего пролета и во время от-кочевки в августе (0,001-0,002). [3] Литература: 1. В.К. Рябицев. ППтицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Издво Пуральского Пуниверситета, По 2000. 2.В.В.Якименко. | "Материалы | по | распространению | птиц | омской | области | Сообщение | 1. Певоробьиные. Петественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. П. — Вып. П. 3. П. — Певоробьиные науки по экология. Омск: Пизд-во ОмГПУ, 1998. 3. С.А.Соловьев. ППтицы Омска и его окрестностей. П Новосибирск. Изд-во "Наука", □ 2005. Наблюдения:

1. Омская обл. Омский р-н, оз. близ п. Иртышский. 28.05.14; 05.06.14; 08.07.14; 04.08.14 (Круглова Елена).



КРУГЛОНОСЫЙ ПЛАВУНЧИК

Автор: Administrator 10.11.2012 17:31 - Обновлено 18.04.2017 07:56

