

Описание:

Размером с дрозда, немного меньше дупеля. Внешне отличается от дупеля тем, что низ груди и брюшко белые, без пестрин, вершины круп-ных кроющих крыла не белые, а охристые, на хвосте белого очень мало, и при взлете обычно виден в целом рыжий хвост. От азиатского бекаса и лесного дупеля с расстояния почти не отличим, лишь с опытом можно узнавать бекаса по более длинному клюву и относительно небольшой (узкой) голове; у сидящего бекаса хвост выдается за концы крыльев; с близкого расстояния можно отличить по ширине светлой брови: у обыкновенного бекаса она возле клюва всегда уже, чем темная уздечка. По заднему краю крыла, по концам второстепенных маховых, белая поло-са. Нижняя поверхность крыла полосатая. Только держа птицу в руках, можно использовать самый надежный признак — форму перьев хвоста: у бекаса крайние рулевые имеют ширину не меньше 6 мм, число рулевых — 6—9 пар, чаще всего 7. На внешнем опахале крайнего первостепенного махового пера преобладает белый цвет. От гаршнепа отличается круп-ными размерами, относительно и абсолютно более длинным клювом (всегда длиннее 55 мм), расцветкой верха головы (светлая полоска про-ходит посередине). Отличительной особенностью может служить пове-дение после взлета: лишь первые несколько метров бекас пролетает пря-мо, после чего переходит на быстрый зигзагообразный полет. Самка и самец с расстояния практически неотличимы. У самок внешние рулевые перья короче 43 мм, у самцов они длиннее 47 мм. Сезонные изменения окраски несущественны.

Молодые очень похожи на взрослых, отличаются наличием охристых каемок на верхних кроющих крыла (у взрослых на вершинах этих кро-ющих округлые белесые пятна); сверху молодые темнее взрослых, сни-зу темные пестрины более широкие. Весной годовалые (2-й календар-ный год) отличаются от более старых сильно обношенными первосте-пенными маховыми.

Вес 80—170 г, длина 25—27, крыло 12,3—14,4, размах 37—43 см. [1]

Распространение:

Обычный вид, населяющий луго-болотные местообитания и болота различного типа. В северной лесостепи пролет проходит в конце первой-второй декадах мая. Послегнездовые кочевки начинаются в июле, завершается осенний пролет в первой половине октября. В южной тайге населяет болота переходного-типа (4 ос.), в подтаежной зоне - заболоченные березовые леса (до 6 ос.) и разнообразные типы болот (1,4-9,4 ос.), предпочитая болота барабинского и южно-западносибирского типа. В северной лесостепи населяет лесостепные осоко-кочкарниковые болота (2-4 ос.). На про-лете, кроме болот, встречается по берегам и тростниковым займищам озер. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В начале XX в. под Омском бекас был обычным гнездящимся видом [Коте, 1910]. Позднее, летом, в Омске не гнезвился [Федоров, Кантаева, 1970] или редко гнезвился на левобережье Иртыша [Миловидов, Шевырнов, 1977; Гынгазов, 1981].

Во время пролета (во второй половине мая) бекас многочислен на городских пойменных открытых низинных болотах (20). В гнездовой период (во второй половине июня) он многочислен на ивняково-осоковых болотах (10). В 2,5 раза меньше его на надпойменных открытых низинных болотах и в 10 раз - на заливных лугах с выпаса-ми. В послегнездовой период (со второй половины июля) многочислен на заливных лугах с участками выпасов (72) и надпойменных открытых низинных болотах, но его там в 4,5 раза меньше. На ивняково-осоковых болотах обычен (6). В первой половине августа по-прежнему многочислен в местообитаниях лугово-болотных ландшафтов. Самое позднее токование бекаса в окрестностях Омска отмечено 6 августа 1890 г. [Сотников, 1892a]. В это время его обилие снижается на заливных лугах в 1,4 раза. В то же время на ивняково-осоковых болотах обилие возрастает в 5,6 раза, а на над-пойменных открытых низинных болотах - в 3,2 раза. Отлет бекаса идет во второй по-ловине августа и в сентябре [Словцов, 1881]. Во второй половине августа бекас исче-зает на надпойменных открытых низинных болотах и начинает концентрироваться на заливных лугах, где его обилие возрастает вдвое, а на ивняково-осоковых боло-тах - в 1,2 раза. На берегах слабосоленых озер обычен (1).

В среднем за лето бекас многочислен в лугово-болотных ландшафтах (23). В то же время на городских пойменных низинных болотах он очень редок (0,01), как и на берегах озер (0,08). В среднем по району исследований на пролете чрезвычайно ре-док (0,001). В гнездовой период (со второй половины июня) редок (0,3) и очень редок в первой половине июля (0,03). Во время кочевки и в начале отлета (во второй поло-вине июля и начале августа) он становится обычен (3), но к концу лета его обилие воз-растает в 1,6 раза.[3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. оз. близ п. Иртышский. 10.09.15 (Круглова Елена)

БЕКАС

Автор: Administrator

10.11.2012 17:36 - Обновлено 16.10.2015 03:24

