Описание:

Самый крупный из наших куликов, больше вороны. Можно спу-тать со средним кроншнепом, от которого следует отличать по относи-тельно более длинному клюву (2/3 общей длины головы или более, у взрослых — 117—179 мм). На темени нет выраженных продольных по-лос, общий тон окраски слегка рыжеватый. Морфологические промеры у зтих видов перекрываются незначительно, и наибольшую диагности-ческую ценность имеет длина цевки. Нижние кроющие крыла белые; у птиц, обитающих к востоку от Урала, на иих есть немногочисленные темные пестрины, в Предуралье обитают птицы с сильным опестрени- ем низа крыла.

Самки окрашены так же, как самцы, но в среднем крупнее и более длин- ноклювы. Сезонные изменения окраски несущественны. Молодые (осо-бенно самцы) имеют клюв заметно короче и прямее, чем у взрослых, оперение с еще более выраженным рыжим налетом, пестрины на груди и боках имеют вид узких штрихов, перья на спине с широкими охрис-тыми каемками. Цевка 67—94 мм. Вес 500—1200 г, длина 50—60, кры-ло 26,8—32,6, размах 80—100 см. [1]

Распространение:

Весенний пролет проходит с середины апреля до середины мая. Осенние кочевки начинаются в последней декаде июля. Пролет начи-нается в первой декаде августа и заканчивается в первой декаде сентября. Гнездится группами в таежной зоне только на сфагновых болотах переходного типа (Якименко, 19976), в лесостепи редок (дисперсное гнездование). В степи гнездования не обнаруже-но, однако в начале июля 1996 г. птицы регулярно встречались по берегам пресных и горько-соленых озер (до 2,3 ос.км2 или 13 ос.10 км2) - вероятно летнее пребывание. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Близ Омска 19 мая 1963 г. найдено две кладки по 4 сильно- и слабонасиженных яйца [Гынгазов, Миловидов, 1977]. В 1898 г.

добыт 15 июня в 70 верстах южнее Ом-ска [Елпатьевский, 1901].Нами отмечен в окрестностях пос. Пикетный на берегу сла-босоленого озера 8 июня 1991 г. Несколько раз добывался около Омска в июне [Слов-цов, 1881]. Пуховые птенцы пойманы в окрестностях Омска 29 июня 1887 г. [Сотни-ков, 1892].

В послегнездовой период (в первой половины июля) большой кроншнеп редок на слабосоленых озерах (0,3), добыт в окрестностях Омска 28 августа 1887 г. [Сотни-ков, 1892а]. В среднем за лето и по району исследований очень и крайне редок (0,02 и 0,0002). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. Горьковский р-н. Май 2014 (Грищенко Владимир).

2. Омская обл. Крутинский район. близ оз. Тенис-Салтаим, со стороны пос. Новокарасук. 07.06.14. (В.А.Ш.).

3. Омская обл. Называевский р-н. близ с. Мангут 09.10.14; 10.09.15 (Нагорная Ирина)