СРЕДНИЙ КРОНШНЕП

Описание:

Приблизительно с ворону. Очень похож на большого кронш-непа, и несмотря на значительно меньшие размеры, среднего кронш-непа легко спутать. Основные отличия: более короткий клюв (меньше 2/3 длины головы, у взрослых 65—93 мм), на темени две четкие про-дольные темные полосы со светлым «пробором» посередине. Общий тон окраски нейтральный серый, без теплых рыжеватых тонов; фигура более коротконогая, чем у большого кроншнепа. Нижняя поверхность крыльев у северного подвида N. ph. phaeopus — с поперечными пест-ринами, у южного (лесостепного) подвида N. ph. alboaxillaris нижние кроющие крыла белые, без пестрин (табл. 46, 3а). У птиц южного под-вида нет темных пестрин на белых пояснице и надхвостье, а у северно-го подвида — есть.

Самцы немного мельче самок, по окраске не отличаются. Сезонные из-менения окраски незначительны. Молодые слегка рыжеватые, особен-но широкие каемки на перьях спины и верха крыльев, пестрины на гру-ди узкие, штриховые. Цевка 52—68 мм. Вес 300—500 г, длина 40—46, крыло 21,4—27,8, размах 77—90 см. [1]

Распространение:

Редкий пролетный вид, встречающийся эпизодиче-ски во второй половине мая в северной лесостепи. [2]

Пролетный вид. В начале XX в. был редок на пролете в окре-стностях Омска [Шухов, 1948]. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.