Автор: Administrator
10.11.2012 17:41 - Обновлено 15.11.2012 09:08

СЕРЕБРИСТАЯ ЧАЙКА

Описание:

Очень похожа на восточную клушу и особенно на хохотунью. У взрослых птиц наиболее важное отличие —- телесно-розовый цвет ног (не путать с полувзрослыми хохотуньями — см. выше). В осеннем наря-де на голове и шее (иногда и на верхе груди) темные пестрины. Чередо-вание нарядов и размеры в общем как у восточной клуши и хохотуньи. [1]

Распространение:

На озерах лесной зоны гнездование не отмечено. Обычный вид озер лесостепной (2,1-10,2 ос.) и степной зон (2,4-6,7 ос.), однако крупные гнездовые колонии отмечены только на оз. Салтаим-Тенис в северной лесостепи и оз. Чебаклы и Алабота в степи. На остальной территории гнездование дисперсное или не-большими (до 10 пар) группами. По утверждению д-ра Л.Йонссона (L.Jonsson, Швеция), работавшего с нами в 1998 г., чайки, гнездящиеся в Омской области, относят-ся к подвиду L. a. barabensis (По Л.С.Степаняиу, 1990, - хохотунья L. c. cachinnans.). На озерах северной лесостепи в гнездовой период встречаются отдельные особи и неболь-шие группы неразмножающихся птиц, в степи это является нормой (1,4 ос.). Весенний пролет проходит в апреле, первые птицы появляются в первой-второй декаде. Заверша-ется пролет в первой (как правило)-второй декадах мая, когда местные птицы уже на-сиживают кладки. Осенняя миграция начинается в первой половине августа, в конце августа-начале сентября на озерах северной лесостепи остаются преимущественно пти-цы текущего года рождения. В сентябре, преимущественно во второй половине, прохо-дит пролет северных, завершающийся в первой декаде октября. В это время на озерах северной лесостепи встречаются небольшие группы (судя по окраске)

L.a.taimyrensis. [2]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.