

Описание:

Со скворца. Весной туловище черное, крылья сверху светло-серые, а по переднему краю от основания до сгиба — белые, и это основное отличие от черной крачки; снизу у летящих птиц видно еще одно отличие — контрастную двухцветную окраску крыла. Хвост и надхвостье белые. Клюв красновато-черный, ноги ярко-красные. Хвост с неглубокой вырезкой.

Осенью взрослые птицы в основном белые, с серым налетом на крыльях, корпусе, с черным пятном позади глаза и темно-серым, со светлыми пестринами, затылком. По бокам груди темных пятен нет, в отличие от черной крачки.

Молодые имеют в общем такую же окраску головы, но спина у них очень темная и довольно темные крылья; отличие от молодых черных крачек — очень светлый, почти белый хвост, резко контрастирующий с темной спиной, отсутствие темных пятен по бокам груди. Вес 53—80 г, длина 20—23, крыло 20,0—22,4, размах 63—67 см. [1]

Распространение:

Широко распространенный, местами многочисленный колониальный вид лесостепной и степной зон. К северу численность снижается: в июне на пресных озерах подтаежной зоны эпизодически встречаются только кочующие группы. В северной лесостепи появляется во второй половине мая, в степи в это время уже начинаются брачные игры. Осенний пролет завершается в августе. Населяет пресные сильно заросшие тростником мелководные водоемы и тростниковые займища. Вероятно, конкурирует с черной крачкой (совместного гнездования не отмечено при сходстве гнездовых биотопов), которую "замещает" на степных водоемах. [2]

СВЕТЛОКРЫЛАЯ КРАЧКА

Автор: Administrator

10.11.2012 17:42 - Обновлено 07.06.2014 14:10

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В середине XX в. многочислена на гнездовании в Омске [Гынгазов, 1981].

Во время пролета (со второй половины мая) светлокрылая крачка весьма многочислена на пойменных и надпойменных открытых низинных болотах (306), обычна на Иртыше за городом (5), слабосоленых озерах (2), и очень редка в поселках городского типа (0,03).

Три гнезда с кладками по 3 яйца найдены 6 июня 2003 г. на открытом низинном болоте близ пос. Березовка Марьяновского района. Одно гнездо с 6 яйцами найдено там же 11 июня 2003 г. и три гнезда с 2 и 3 яйцами - 27 июня 2003 г.

В гнездовой период в июне эта крачка по-прежнему весьма многочислена на городских пойменных низинных болотах (609), многочислена на надпойменных низинных болотах, заливных лугах с участками выпасов (82 и 38) и на Иртыше (11). Обычна на пойменных водоемах и ивняково-осоковых болотах (2-3). Редка в пойменных ивняках, выпасах, полях многолетних трав с колками и выгонах (0,1-0,2). Очень редка в пойменных лугах с покосами (0,06).

После появления птенцов в начале июля светлокрылая крачка весьма многочислена на городских пойменных низинных болотах (118), многочислена в лугово-болотных ландшафтах (12-78) и обычна на озерах (2-9), на ивняково-осоковых болотах обычна, редка на полях подсолнечника (0,2), чрезвычайно и очень редка на полях ку-курузы и выгонах (0,005-0,06).

С началом послегнездовых кочевок во второй половине июля эта крачка весьма многочислена на заливных лугах с участками выпасов (104), многочислена на полях подсолнечника, надпойменных открытых низинных болотах и слабосоленых озерах (10-72), обычна в мелких поселках (7), на выгонах и полях яровых с колками (1-2), редка в крупных поселках, новых пойменных парках (0,2-0,5) и чрезвычайно и очень редка на ивняково-осоковых болотах и полях яровых с колками (0,004-0,06).

В августе начинается отлет и пролет, во время которого она остается многочислена на надпойменных открытых низинных болотах и заливных лугах с участками выпасов. Обилие ее снижается в 1,5 и 8 раз, как и на слабосоленых озерах в первой половине

августа. Последнее местообитание - единственное урочище, где эта крачка встречена в конце лета. Здесь она многочислена (21). Обычна в начале августа на полях, выгонах и крупных поселках (1-4) и редка на полях яровых с колками и мелких поселках (0,2).

В среднем за лето светлокрылая крачка многочислена в лугово-болотных ландшафтах (35), обычна на слабосоленых озерах (9), крупных реках и пойменных низинных болотах в городе (2), редка в лесопольях (0,7) и чрезвычайно редка в пойменных лесолуговых ландшафтах (0,009). В среднем по району исследований на пролете во второй половине мая обычна. В начале гнездования ее обилие возрастает в 2,9 раза, во второй половине июня оно снижается в 1,6 раза и возрастает в 1,7 раза в первой половине июля после появления молодых. Во второй половине июля после поднятия молодых на крыло обилие повышается в 2,6 раза. В первой половине августа она по-прежнему обычна, но ее обилие снижается в 5,7 раза и во второй половине августа из-за отлета основной части птиц она становится очень редка (0,02). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

СВЕТЛОКРЫЛАЯ КРАЧКА

Автор: Administrator

10.11.2012 17:42 - Обновлено 07.06.2014 14:10

Наблюдения:

1. Омская обл. Чернолученско-Красноярская санаторная зона. 21.05.09 (Круглова Елена).
2. Омская обл. оз. близ п. Иртышский. 17.05.14 (Зирнит Денис).
3. Омская обл. Оконешниковский р-н, близ. д. Ленинск 03.06.14(Князев Святослав).



СВЕТЛОКРЫЛАЯ КРАЧКА

Автор: Administrator

10.11.2012 17:42 - Обновлено 07.06.2014 14:10

