Описание:

Крупный кулик, с голубя. Верх тела блестяще-зеленый, с пурпурным, синим и фиолетовым отливом, издали кажется темно-серым или черным, брюхо чисто белое. На затылке длинный тонкий хохол, подхвостье рыжее, ноги красно-бурые, четырехпалые. В полете отличается от всех других куликов широкими закругленными крыльями, хвост сверху белый с черной предвершинной полосой. Самка похожа на самца, но ее лицо в целом "чумазее" и светлее, черные участки оперения с белыми перестринами, подбородок и горло обычно совсем белые (у самца - черные), хохол короче. У самца конец крыла (в кистевой части) гораздо шире, чем в области предплечья, у самок это расширение не столь заметно. Осенняя окраска сходна с весенней, но у всех птиц подбородок, горло, а часто - и верх груди белые, на лице охристый налет, есть охристые каемки на перьях в лопаточной области и на больших кроющих крыла (на мелких кроющих крыла светлых каемок нет). У молодых короткий хохол, перья верха со светлыми каемками (в том числе и на малых кроющих крыла), крылья более узкие, чем у взрослых. Годовалые птицы (2-е календарное лето) отличаются от более старых тусклым отливом верха, более узкими крыльями, контактный признак - сильно обношенные первостепенные маховые. Вес 180-230 г, длина 28-31, крыло 21.0-23.7, размах 70-76 см. [1]

Распространение:

Первое появление весной - в первой половине апреля, основной пролет происходит на 2-3 недели позднее. Населяет разнообразные луго-полевые и луго-болотные местообитания всех ландшафтных зон области. В лесной зоне редкий вид осоко-сфагновых болот переходного типа и малочисленный (2,5 ос.) - на южно-западносибирских болотах. В лесостепи и степи обычен, местами многочислен. В северной лесостепи отмечены 8-кратные колебания обилия по годам (5-40 ос.). В степи и южной лесостепи предпочитает берега пресных озер (14,6-19,4 ос.), избегая горько-соленые водоемы. (4 ос.). [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В гнездовой период (в первой половин

е июня) чибис многочислен на надпойменных открытых низинных болотах, где его обилие увеличивается в 1,4 раза, на городских пойменных открытых низинных болотах оно возрастает в 3,8 раза. Многочислен также в это время чибис на выгонах и на заливных лугах и пойменных лугах с покосами (16-17), обычен в старых парках, на берегах слабосоленых озер и на ивняково-осоковых болотах (7-8). На свалках и выгонах с открытыми полями яро¬вых его обилие чуть меньше (4-5). В ряде других местообитаний, таких как поля кукурузы, многолетних трав и пойменные водоемы левобережья Иртыша, он также обычен, но его уже заметно меньше (1 -2). В это время чибис редок в пойменных ив¬няках с выпасами, в парах с колками, как и в мелких поселках и поселках городского типа (0,1).

Во второй половине июня у ряда пар появляются птенцы. В это время чибис также многочислен на выгонах (13), а на открытых полях яровых его обилие возрастает в 6 раз. Для заливных лугов с участками выпасов значения увеличиваются вдвое, а на надпойменных открытых низинных болотах остаются прежними (26). В это же время на городских пойменных открытых низинных болотах происходит снижение обилия в 7,6 раза. Здесь чибис становится обычным, как и на слабосоленых озерах, полях подсолнечника и кукурузы, и остается таковым на ивняково-осоковых болотах и лугах аэропорта (5-9). На пойменных лугах с покосами его обилие снижается в 8 раз, такое же обилие в открытых полях многолетних трав (3), редок он в полях яровых и озимых с колками и на черных парах (0,6-0,5).

В послегнездовой период с первой половины июля чибис по-прежнему многочислен в ряде местообитаний лугово-болотных ландшафтов: на заливных лугах с участками выпасов (34), на надпойменных открытых низинных болотах, где его оби¬лие возросло в 1,3 раза, и на пойменных болотах в городе в 2,5 раза, меньше его на выгонах (18), слабосоленых озерах (12) и на полях яровой пшеницы (10), обычен на поливных полях многолетних трав с колками, полях кукурузы, свалках и пойменных лугах с покосами, берегах Иртыша за городом и на открытых полях многолетних трав (2-3), очень редок в полях подсолнечника (0,6).

Во второй половине июля чибис начинает постепенно откочевывать из лесополе¬вых ландшафтов, где в это время проходят интенсивные сельскохозяйственные работы, и из некоторых других ландшафтов. Так, на выгонах его обилие уменьшается к концу месяца в 2,5 раза, а на открытых полях яровой пшеницы - в 1,4 раза (здесь чибис обычен, как на полях многолетних трав). Увеличение обилия проходит в луго¬во-болотных ландшафтах. На надпойменных открытых низинных болотах он многочислен в июле (34), на заливных лугах в начале этого периода его столько же, но ко второй половине июля обилие возрастает в 1,7 раза. На городских пойменных низинных болотах его в 2,7 раза больше. В конце июля чибис здесь такж

е многочислен (54), как и на слабосоленых озерах (28), где обилие его возрастает в 2,3 раза.

В августе чибис большими стаями держится близ рек и озер [Сотников, 1892а]. В период послегнездовых миграций (в первой половине августа) он по-прежнему мно гочислен на слабосоленых озерах (26), где к концу августа в результате подкочев- ки птиц из других местообитаний его обилие возрастает вдвое. На выгонах его б ольше в 5,2 раза, в пойменных лугах, покосах - в 4 раза, на свалках - в 2. В луг ово-болотных ландшафтах в первой половине августа он многочислен на открытых низинных болотах и заливных лугах (45 и 43) и обычен на ивняково-осоковых бол отах (6). К концу августа, с иссушением лугов и болот и увеличением пастбищной нагрузки, чибис покидает их и остается редким на надпойменных открытых низинн ых болотах. На заливных лугах многочислен (26), но к концу августа его обилие у меньшается в 1,6 раза. На городских пойменных низинных болотах он обычен весь август (6).

В среднем за лето чибис многочислен на заливных лугах (34), надпойменных откр ытых низинных болотах, в том числе и на городских пойменных низинных болотах (24-26), слабосоленых озерах (20) и на выгонах (13), обычен в ряде открытых агро це- нозов лесополевых ландшафтов (полях пшеницы, кукурузы, подсолнечника и мн оголетних трав), а также на пойменных лугах с покосами и ивняково-осоковых бол отах (1-7), в новых пойменных парках и на свалках (1-3), редок и очень редок в о блесенных и закустаренных агроценозах лесополевых ландшафтов (0,1-0,04). В сре днем по району исследований во время пролета и в гнездовой период (3-4) обыче н, а в конце периода его обилие увеличивается в 1,7 раза. В июле после появлен ия слетков он по-прежнему обычен (4). Во время предотлетных миграций в августе его обилие уменьшается вдвое. Исчезает чибис из окрестностей Омска в конце а вгуста и в начале сентября [Словцов, 1881; Сотников, 1892а]. Одиночная птица от мечена нами 9 октяб¬ря 2004 г. близ пос. Юрьево Кормиловского района. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд- во Уральского университета, 2000.

2.В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

Близ водоемов Омской области.

Прилет: 26.03.14 (Круглова Елена)

ЧИБИС

Автор: Administrator
10.11.2012 14:49 - Обновлено 28.05.2017 18:06







