

Описание:

Самая крупная из поганок, с крякву, но стройнее. От серошекой поганки весной и в начале лета отличается пышным воротником и "ушами", в осеннем перье - чисто белой передней стороной шеи, наличием белой полосы выше глаза и темной "уздечки", красноватым клювом. У молодых до осени сохраняются полосы на голове. В отличие от молодых серошеких поганок, полосы спускаются и на шею. Глаза у взрослых птиц красные, у молодых - розовые. На крыле у всех птиц белое зеркало и белое пятно на переднем крае крыла, смыкающееся по основанию крыла с зеркалом. Вес 570-1500 г, длина 46-51, крыло 16.8-20.9, размах 85-95 см. [1]

Распространение:

Обычный вид пресных водоемов с бордюрным и бордюрно-займищным типом зарастания в лесостепной (0,6-4,4) и степной (8,8-12,8) зонах. Гнездование дисперсное, парцилярная группа зарегистрирована один раз. По пойменным водоемам р. Иртыш проникает в лесную зону. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В гнездовой период на пойменных водоемах левобережья Иртыша в первой половине июня обычна (4), после появления птенцов во второй половине июня ее обилие возрастает в 4 раза, и она становится многочисленна (16). На глиняных карьерах окраины Омска 4 июля 1997 г. отмечена пара чомга с 5 птенцами размером в половину взрослой птицы. С началом кочевков в первой половине июля на пойменных водоемах левобережья Иртыша в этот период она обычна (1). В конце июля они сбиваются в стайки (12-15). В среднем за лето чомга обычна на пойменных водоемах левобережья (8). [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.
2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.
3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

Озера и реки в городе и по области.

Прилет: 17.04.2014 (Круглова Елена)



