

Описание:

Утка средних размеров, немного крупнее хохлатой чернети. У самца весной голова, шея и грудь черные, с зеленым отливом; в отличие от самцов хохлатой чернети, спина светло-серая, с мелким поперечным струйчатым рисунком, издали выглядит белой, почти одного цвета с чисто-белыми брюхом и боками (отсюда народное название — белобок). Хохла нет.

Общий тон окраски самки бурый, довольно изменчивый — от рыжевато- до темно-бурого, обычно они более светлые и рыжие, чем самки хохлатой чернети, брюхо грязновато-белое. В отличие от хохлатой чернети, на «лице» вокруг клюва широкое грязно-белое кольцо, часто бывает более или менее заметное светлое пятно на щеке (на ухе), более выраженное летом. У добытой самки можно разглядеть на бурой спине поперечный струйчатый рисунок, которого нет у хохлатой чернети. Клюв широкий серо-голубой, более яркий у самцов. Глаза желтые, лапы серые, во всех нарядах на всю длину крыла — белое зеркало, как у хохлатой чернети. У самца после летней линьки угадывается прежний весенний рисунок, но по всему наряду у много бурых перьев, на груди белые пестрины, часто бывают посветления у клюва и на ухе, где и у самки, но гораздо слабее, голова без блеска.

У осенних молодых окраска почти как у самок, но кольцо вокруг клюва узкое, неполное или его нет, бока более равномерно бурые, глаза желто-бурые; молодые самцы отличаются от самок более выраженным струйчатым рисунком на спине, более темными головой и грудью. У годовалых самцов в брачном наряде могут быть «помарки» — элементы самочьего наряда, слабее зеленый отлив, спина с буроватым налетом. По размерам самки и самцы сходны: вес 900 — 1200 г, длина 42—51, крыло 20,2—23,7, размах 72—84 см. [1]

Распространение:

МОРСКАЯ ЧЕРНЕТЬ

Автор: Administrator

10.11.2012 16:38 - Обновлено 16.10.2015 03:19

Малочисленный пролетный вид. Иногда добывается во время осенней охоты в период ледостава на озерах. [2]

Пролетный вид. На пролете морская чернеть добыта под Омском [Шухов, 1930]. Во второй половине XX в. она встречалась летом в Омске [Федоров, Кантаева, 1970], но не гнездилась [Миловидов, Шевырнов, 1977]. [3]

Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. — Вып. 3. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

Наблюдения:

1. Омская обл. оз. близ п. Иртышский. 08.10.15 (Круглова Елена)

МОРСКАЯ ЧЕРНЕТЬ

Автор: Administrator

10.11.2012 16:38 - Обновлено 16.10.2015 03:19

