

# КРУГЛОНОСЫЙ ПЛАВУНЧИК

Автор: Administrator

10.11.2012 17:31 - Обновлено 18.04.2017 07:56

---

## Описание:

Чуть больше воробья. В окраске спины преобладает сизо-серый цвет с охристыми пестринами, сливающимися в продольные полосы. На боках шеи рыжие пятна, горло и брюшко белые. Клюв полностью темный, шиловидный (см. рис. 4). Как правило, самцы гораздо бледнее самок, но их индивидуальная окраска очень различна, некоторые самцы яркие, и отличать их от самок надо по наличию на темном темени рыжеватых пестрин. У самок темно-сизая голова, без пестрин, рыжие пятна на шее более яркие. В брачном наряде сходных видов нет. Во всех нарядах на раскрытом крыле сверху широкая белая полоса, бока над-хвостья белые.

В зимнем перье, которое взрослые начинают приобретать в июле — августе, с большими индивидуальными вариациями, низ белый, верх серый, на глазу и за глазом удлиненное темное пятно. С большого расстояния осенью от плосконосого плавунчика следует отличать по темной спине.

Молодые сверху темно-бурые, с широкими рыжими каемками на перьях спины; на шее, груди и боках интенсивный розовато-бурый налет, шапочка темная. От молодых плосконосых плавунчиков их следует отличать по тонкому клюву и большому главному пятну. На осенней миграции многие молодые начинают линять в зимнее перо и становятся похожими на взрослых, но темя остается очень темным. Вес 20—53 г, длина 18—19, крыло 10,2—11,8, размах 31—34 см. [1]

## Распространение:

Во время весеннего и осеннего пролета встречается на пресных водоемах лесной и лесостепной зон области группами менее 10 птиц. Во второй половине мая 1998 г. наблюдали кратковременную остановку (менее 2 суток) пролетных скоплений (более 2000 птиц) на оз. Атаичье (Степной заказник). В се-верной лесостепи весенний пролет наблюдаем между 20 мая и 15 июня, как правило группами менее 10 птиц. Осенние

## КРУГЛОНОСЫЙ ПЛАВУНЧИК

Автор: Administrator

10.11.2012 17:31 - Обновлено 18.04.2017 07:56

---

кочевки - с первой декады августа, пролет завершает-ся к середине сентября. [2]

Пролетный вид. Во время весеннего пролета (в первой половине июня) круглоносый плавунчик обычен на слабосоленых озерах (2), как и во второй половине августа во время летних кочевок (3).

В среднем за лето круглоносый плавунчик редок на озерах (0,7), в среднем по району исследований чрезвычайно редок во время весеннего пролета и во время от-кочевки в августе (0,001-0,002). [3]

### Литература:

1. В.К.Рябицев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

### Наблюдения:

## КРУГЛОНОСЫЙ ПЛАВУНЧИК

Автор: Administrator

10.11.2012 17:31 - Обновлено 18.04.2017 07:56

---

1. Омская обл. Омский р-н, оз. близ п. Иртышский. 28.05.14; 05.06.14; 08.07.14; 04.08.14  
(Круглова Елена).



## КРУГЛОНОСЫЙ ПЛАВУНЧИК

Автор: Administrator

10.11.2012 17:31 - Обновлено 18.04.2017 07:56

---

