

# БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП

Автор: Administrator

10.11.2012 17:38 - Обновлено 21.05.2016 19:04

---

## Описание:

Самый крупный из наших куликов, больше вороны. Можно спутать со средним кроншнепом, от которого следует отличать по относительно более длинному клюву (2/3 общей длины головы или более, у взрослых — 117—179 мм). На темени нет выраженных продольных полос, общий тон окраски слегка рыжеватый. Морфологические промеры у этих видов перекрываются незначительно, и наибольшую диагностическую ценность имеет длина цевки. Нижние кроющие крыла белые; у птиц, обитающих к востоку от Урала, на их есть немногочисленные темные пестрины, в Предуралье обитают птицы с сильным опестрением низа крыла.

Самки окрашены так же, как самцы, но в среднем крупнее и более длинноклювы. Сезонные изменения окраски несущественны. Молодые (особенно самцы) имеют клюв заметно короче и прямее, чем у взрослых, оперение с еще более выраженным рыжим налетом, пестрины на груди и боках имеют вид узких штрихов, перья на спине с широкими охристыми каемками. Цевка 67—94 мм. Вес 500—1200 г, длина 50—60, крыло 26,8—32,6, размах 80—100 см. [1]

## Распространение:

Весенний пролет проходит с середины апреля до середины мая. Осенние кочевки начинаются в последней декаде июля. Пролет начинается в первой декаде августа и заканчивается в первой декаде сентября. Гнездится группами в таежной зоне только на сфагновых болотах переходного типа (Якименко, 19976), в лесостепи редок (дисперсное гнездование). В степи гнездования не обнаружено, однако в начале июля 1996 г. птицы регулярно встречались по берегам пресных и горько-соленых озер (до 2,3 ос.км<sup>2</sup> или 13 ос.10 км<sup>2</sup>) - вероятно летнее пребывание. [2]

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Близ Омска 19 мая 1963 г. найдено две кладки по 4 сильно- и слабонасиженных яйца [Гынгазов, Миловидов, 1977]. В 1898 г.

## БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП

Автор: Administrator

10.11.2012 17:38 - Обновлено 21.05.2016 19:04

---

добыт 15 июня в 70 верстах южнее Омска [Елпатьевский, 1901]. Нами отмечен в окрестностях пос. Пикетный на берегу слабосоленого озера 8 июня 1991 г. Несколько раз добывался около Омска в июне [Словцов, 1881]. Пуховые птенцы пойманы в окрестностях Омска 29 июня 1887 г. [Сотников, 1892].

В послегнездовой период (в первой половине июля) большой кроншнеп редок на слабосоленых озерах (0,3), добыт в окрестностях Омска 28 августа 1887 г. [Сотников, 1892а]. В среднем за лето и по району исследований очень и крайне редок (0,02 и 0,0002). [3]

### Литература:

1. В.К.Рябцев. "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири". Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2000.

2. В.В.Якименко. "Материалы по распространению птиц омской области" Сообщение 1. Неворобьиные. Естественные науки и экология. Ежегодник ОмГПУ. – Вып. 3. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998.

3. С.А.Соловьев. "Птицы Омска и его окрестностей". Новосибирск. Изд-во "Наука", 2005.

### Наблюдения:

## БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП

Автор: Administrator

10.11.2012 17:38 - Обновлено 21.05.2016 19:04

---

1. Омская обл. Горьковский р-н. Май 2014 (Грищенко Владимир).
2. Омская обл. Крутинский район. близ оз. Тенис-Салтаим, со стороны пос. Новокарасук. 07.06.14. (В.А.Ш.).
3. Омская обл. Называевский р-н. близ с. Мангут 09.10.14; 10.09.15 (Нагорная Ирина)



# БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП

Автор: Administrator

10.11.2012 17:38 - Обновлено 21.05.2016 19:04

---

